


- 植 物 -

彦根市の植物調査結果の概要

今回の調査で確認された植物の種数は1518種(栽培種を除く)で、1500種を超える植物が彦根市内に自生していることが明らかとなった。この数は滋賀県内でこれまでに確認された植物の種数(約2500種)の約5分の3に相当する。また、このうちアレチヌスビトハギ、アレチモウズイカ、サボンソウ、アメリカフウロなどの帰化植物(史前帰化植物を除き、逸出を含む)の数は273種で、彦根市全体の帰化率(全種数に占める帰化植物の割合)は約18%であった。

彦根市の日本海指数(90以上が日本海側の気候区に属する)は約85(右図)で、日本海側気候区と太平洋側気候区のほぼ境界に位置している。このため、両気候区の植物が市内では混在している。たとえば、日本海側の植物としてはタイミンガサ、イワナシ、エゾアジサイ、タニウツギ、チャボガヤ、ツルシキミ、ハイヌガヤ、オオイワカガミ、ホクリクネコノメソウ、ポタンネコノメソウなど、太平洋側の植物としてはナガバノスミレサイシン、イロハモミジ、コセリバオウレン、スイラン、スズカアザミ、トウゴクサバノオ、ミヤコアオイなどが今回の調査で確認された。垂直分布的には、武奈町の標高500m付近にブナ林が



彦根市周辺の日本海指数

分布していることから武奈町および男鬼町は冷温帯(夏緑広葉樹林帯とかブナーミズナラクラスとも呼ばれる)で、それより標高の低いところは暖温帯(常緑広葉樹林帯とか照葉樹林帯またはヤブツバキクラスとも呼ばれる)に含まれる。冷温帯の植物としてはブナ、ミズナラ、オヒョウ、ヤマボウシなど、暖温帯の植物としてはコジイ、ヤブツバキ、アラカシ、ヤブニッケイ、タブノキ、モッコク、リンボクなどが今回の調査で確認された。このほか、石灰岩が武奈町、男鬼町、仏生寺町、荘厳寺町、善谷町、中山町付近に分布していることから、これら石灰岩地域ではフクジュソウ、オニシバリ、ヤブサンザシ、マキエハギ、ヒメフウロなど石灰岩地に多く見られる植物が確認された。また、伊吹山地・鈴鹿山脈の固有種としてはタキミチャルメルソウが確認された。笹尾町、野田山町、原町、小野町のような東部丘陵地域ではチャートが分布し、これらの地域では酸性を呈するため小規模ではあるが湿原が分布し、ミズトンボやアギナシなど貴重な植物が多く生育する。

宅地開発などによる湿原やため池の埋め立て、水田の乾田化、除草剤の普及、湖畔の開発、乱獲などによってかつては多数生育していた植物の中で、現在は見られなくなったり、限られた場所にしか生育していないものも少なくない。今回確認された約1500種の植物のうちデンジソウ、アサザ、ガガブタ、ヨウラクランの4種が絶滅種、カラコギカエデ、タイミンガサ、カザグルマ、ハマエンドウ、ホシクサなど24種が絶滅危惧種、カワラアサギ、タチスズシロソウ、オギノツメ、ヤナギトラノオなど21種が危急種、ノハナシヨ

ウブ、カキツバタ、ウマノスズクサ、オミナエシなど61種が希少種、ウメガサソウ、ヤマジノギク、セツブンソウ、コギシギシなど22種が要注目種として挙げられた。これらは彦根市内に生育する植物全体の約8.7%にあたる。また、これらの植物のなかには内湖やため池、湿原などの湿地に生育するものが多く含まれている。たとえば、アサザ、ガガブタ、オニナルコスゲ、カザグルマ、ヌマゼリなどである。また、ハマエンドウ、タチスズシロソウ、ハマゴウなどの海岸性植物が挙げられているのも本市の大きな特徴である。滋賀県のレッドリストにあげられているもののなかで、市内では多数生育し、特別な保護の必要性がないため、本市のリストから外したのものには、オオアカウキクサ、ヤナギイノコズチ、タキミチャルメルソウ、ヒメミソハギ、シソクサ、オグルマ、ヒメヨモギ、コウガイモ、ネジレモ、オオササエビモ、コガマなどがある。

<参考文献>

- レッドデータブック近畿研究会(編). 2001. 改訂・近畿地方の保護上重要な植物 - レッドデータブック近畿 2001 - . 平岡環境科学研究所
- 滋賀県琵琶湖環境部自然保護課(編). 2000. 滋賀県で大切にすべき野生生物(2000年版)
- 環境省野生生物課(編). 2000. 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物[植物(維管束植物)]. (財)自然環境研究センター
- 環境省自然保護局計画課自然環境調査室(1997)都道府県別メッシュマップ 25 滋賀県
- 川崎 健史. 1981. 湖畔の花と実. サンブライト

(村長 昭義)

貴重種の解説・調査結果について

貴重種の解説 -

ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i>	希少種
ウマノスズクサ科	滋賀県： -	近畿： - 国： -

形態の特徴

生息環境

和名 学名(千葉県植物誌に従った) 科名

彦根市におけるカテゴリー区分

「滋賀県で大切にすべき野生生物」によるカテゴリー区分

「改訂・近畿地方の保護上重要な植物」によるカテゴリー区分

環境省のカテゴリー区分

種の概略の大きさ、わかりやすい外形的な特徴等を記載。近似種がある場合はその区別点等についても記載。

生息環境や市内の分布状況を具体的に記載。

メッシュ地図について

メッシュは環境省のメッシュ地図を使用しています。

メッシュは、情報の種類ごとに表示方法をかえています。



今回の調査による情報



過去に存在していたが、現状は不明



過去に存在していたが、現在は確認できない

分布状況を示すにあたり、メッシュによる表示を行っていますが、これは、メッシュ内全域に確認記録があるというわけではなく、メッシュ内のどこかに確認記録があるということです。

今回の調査結果で、絶滅のおそれのある種とその現状が明らかになりました。本書において、本来こうした情報をすべて記載し、野生生物の保全に役立てるべきものと考えますが、こうした情報の公開については、逆に希少性という観点から採取されてしまう恐れが発生します。

こうしたことから、貴重な野生生物のうち、特にその分布状況や生息(生育)地について公開すべきでない判断したものについては、部分的に非公開として、記載をひかえています。

- 調査結果 -

科名	和名	別名	学名	産地(町名)	国	近畿	県	市	植栽・帰化等

科名 和名 別名 学名

今回の調査結果を記載

環境省のカテゴリー区分

「改訂・近畿地方の保護上重要な植物」によるカテゴリー区分

「滋賀県で大切にすべき野生生物」によるカテゴリー区分

彦根市におけるカテゴリー区分

植栽・史前帰化・帰化・逸出・栽培を記載

史前帰化植物・・・米作や畑作に伴って外国から日本に侵入し、野生化した植物。江戸末期以前に侵入したものを指す。水田や畑の雑草のほとんどがこれに含まれる。

帰化植物・・・江戸末期以後、外国から日本に侵入、野生化している植物。

逸出・・・国内産の植物の中で、栽培していたものが逃げ出したもの。本来、本地域に生育していない国内産の植物。

カテゴリーに記載している記号について

環境省		近畿	
絶滅	EX	絶滅種	絶滅
野生絶滅	EW	絶滅危惧種 A	A
絶滅危惧 A 類	CR	絶滅危惧種 B	B
絶滅危惧 B 類	EN	絶滅危惧種 C	C
絶滅危惧 類	VU	準絶滅危惧種	準
準絶滅危惧	NT		
情報不足	DD		

滋賀県		彦根市	
絶滅危惧種		絶滅種	A
絶滅危機増大種		絶滅危惧種	B
希少種		危急種	C
要注目種		希少種	D
分布上重要種		要注目種	E
その他重要種			
絶滅種			

デンジソウ *Marsilea quadrifolia*


絶滅種

デンジソウ科

滋賀県：絶滅種 近畿：絶滅危惧種 B 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 夏緑性のシダ植物。根茎は細く長く横走して分枝し、やや接して葉をつける。葉柄は長さ 10～15cm で無毛。先端に小葉が四葉のクローバーのように田の字形に並ぶ。孢子嚢果は葉柄の基部のやや上から出る短い枝に 1～3 個つく。

生育環境 水田や湿地、水路に生育する。滋賀県植物誌（1968）には「大洞」の記載があるが、今回の調査では未確認。



アサザ *Nymphoides peltata*


絶滅種

ミツガシワ科

滋賀県：絶滅危惧種 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 多年生の浮葉植物。根茎は泥の中を長くはい、長い水中茎を出す。葉は円形または卵形で、基部は深く切れ込み、辺縁には低い鋸歯があって波状を呈する。6～8月に葉腋に集散花序をつける。花は黄色で直径 3～4cm、花冠の縁には毛が多い。

生育環境 湖沼やため池、水路などに群生する。市内では『滋賀県植物誌』（1968）に「彦根城」の記録があるが、今回の調査では未確認。



ガガブタ *Nymphoides indica*


絶滅種

ミツガシワ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 多年生の浮葉植物。茎は細長く、1～3個の葉をつける。葉は円心形または卵心形で、基部は深く湾入し、辺縁は全縁である。7～9月に葉柄の基部に多数の白色の花が束生し、葉身の湾入部から水上に出て開花する。夏から秋にかけて葉柄の基部に房状形の殖芽（越冬芽）を形成する。

生育環境 湖沼やため池に群生する。市内では『滋賀県植物誌』（1968）に「彦根城」の記録があるが、今回の調査では未確認。



ヨウラクラン *Oberonia japonica*


絶滅種

ラン科

滋賀県：要注目種 近畿：絶滅危惧種 A 国： -

形態の特徴 多年草。茎は下垂し長さ 2～5cm。葉は肉質で 2 列に平たく互生する。4～6 月に茎頂に総状花序をつける。花序は淡黄褐色の多数の小花からなる。

生育環境 木の幹や岩上に着生する。市内では『滋賀県植物誌』（1968）に「彦根」の記録があるが、今回の調査では未確認。



ヒロハトリゲモ（サガミトリゲモ） *Najas indica*


絶滅危惧種

イバラモ科

滋賀県：要注目種 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 B 類

形態の特徴 沈水性の 1 年生草本。茎はよく分枝する。葉は線形で長さ 1.5～3cm、幅 0.3～0.6mm で縁に細かい鋸歯がある。葉鞘は切形または円形で小刺がある。7～9 月に葉腋に花をつける。種子は長楕円形で、表面には四～六角形の網目模様がある。

生育環境 ため池や水田に生育する。市内では東部の丘陵地で確認。



ヒメサジラン *Loxogramme grammitoides*


絶滅危惧種

ウラボシ科

滋賀県：希少種 近畿： - 国： -

形態の特徴 葉はへら形で 3～10cm。胞子のう群は線形で、葉軸近くから斜上する。根茎は細く、横にはい、暗褐色の鱗片をつける。

生育環境 林下の湿った場所の岩上にコケに混じって生育する。市内では、東部の山地の石垣で確認。



アギナシ *Sagittaria aginashi*

絶滅危惧種

オモダカ科


滋賀県：希少種

近畿：絶滅危惧種 A

国：準絶滅危惧

形態の特徴 葉は根生し、20～50cm の長い葉柄がある。成熟した葉は矢尻形となる。花は単性花で、1m 近くに達する。総状花序の上方に雄花、下方に雌花をつける。3 枚の白色の花弁を持つ。花期は 8～10 月。オモダカに似るが、夏ごろから葉柄基部の内側に多数のむかごをつける。

生育環境 湿地や放棄水田などに生える。市内では、東部の丘陵地で確認。



カラコギカエデ *Acer ginnala var. aidzuense*

絶滅危惧種

カエデ科


滋賀県：要注目種

近畿：- 国：-

形態の特徴 樹高 2～5m の落葉小高木。葉は単葉で対生し、裏面の葉脈上に毛があり、長さ 5～10cm、幅 3～7cm の楕円形で葉縁は 3 浅烈または大きな重鋸歯となる。5～6 月に黄緑色の小花をつけ、8～9 月には約 3mm の毛のある果実をつける。

生育環境 山地の湿地や河原の湿地などに生える。市内では、荒神山周辺の湿地で確認。

備考 県内でも宇曾川沿いに分布しているが、産地は少ない。



アオテンツキ *Fimbristylis verrucifera*

絶滅危惧種


カヤツリグサ科

滋賀県：希少種

近畿：- 国：-

形態の特徴 稈は叢生し伏す。葉は糸状で、小穂は淡緑色で球形。花序は散形状で 10 数個の小穂からなる。そう果には棍棒状の突起がある。

生育環境 湖畔や河畔などの比較的水位変動の激しいところの植被の少ない水が引いた跡地などに生育する。市内では南部の湖岸で確認。



オニナルコスゲ *Carex vesicaria*


絶滅危惧種

カヤツリグサ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 A 国：-

形態の特徴 高さ 0.3～1m。地下匍枝があり、稈の基部は血紫色を帯び、無葉身の鞘と茎はかたく鋭い3稜形でざらつく。上部の雄小穂は2～3個、下部の雌小穂は2～3個で長さは3～7cm。ウマスゲは、上部の雄小穂は1～2個、雌小穂の長さは2～3cmで、稈の基部に鞘はない。

生育環境 湖畔や内湖のヨシ原に生える。市内では内湖で確認。



スイラン *Hololeion krameri*


絶滅危惧種

キク科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ 50～110cm になる多年草。根生葉は線状披針形で、縁にはまばらに鋸歯があり、無毛。9～10月に黄色の頭花をつける。頭花は17～29個の小花からなり、そう果は無毛。

生育環境 湿地に生育する。市内では東部の丘陵地の湿地で確認。



タイミンガサ *Cacalia peltifolia*


絶滅危惧種

キク科

滋賀県：分布上重要種 近畿：準絶滅危惧種 国：-

形態の特徴 茎は太く、高さ 1m ほどの大きな植物。葉は普通 3 個つき、楕状に長柄がつき、直径 35～55cm で 9～14 個に切れ込む。頭花は大きな円錐花序につく。小花は白色で、日が経つと褐色になる。花期は 9～10 月。

生育環境 日本海側の深山のやや湿ったところに生育する。市内では東部の山地でのみ確認。




フジバカマ *Eupatorium japonicum*

絶滅危惧種

キク科

滋賀県：要注目種 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ1~1.5m。葉は短い柄があり対生し、長楕円形~長楕円状披針形で、長さ8~13cm、幅3~4.5cmである。茎中部の葉は3深裂するが、茎の上部・下部の葉は浅く裂けるか、裂けない。頭花は5筒状花からなり、ほとんど白色で枝先に散房状につく。中国原産の栽培品は本種によく似ているが、本種よりも葉が小さく、花は紫色を帯びる。サワヒヨドリは葉の裏に腺点があるが、本種はない。



生育環境 明るい乾いた草地に生育する。市内では愛知川の堤防で確認。


カザグルマ *Clematis patens*

絶滅危惧種

キンポウゲ科

滋賀県：絶滅危惧種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 葉は羽状複葉となるつる植物。小葉は3~5個あり、卵形で先がとがる。花は直径7~12cmと大きく、上向きに咲く。萼片は8枚で、白色または淡紫色である。花柄に苞はない。花期は5月上旬。園芸種のテッセンは萼片が6枚で、花柄に1対の葉状苞がある。




生育環境 ハンノキ林や湿原に接する林縁など湿ったところに生育する。市内では荒神山麓のハンノキ林でのみ確認。

キクザキイチゲ (キクザキイチリンソウ) *Anemone pseudo - altaica* 絶滅危惧種

キンポウゲ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ10~30cmとなる多年草。早春に現われ初夏には枯れる早春季植物。根茎は2~10cmで横にはう。根生葉は2~3回3出複葉。小葉は羽状に深裂する。3月下旬に茎頂に1個の花をつける。花は白色または青紫色で、萼片は8~13枚。



生育環境 主としてブナ帯の落葉広葉樹林の林床に生育する。市内では犬上川および愛知川の河畔林で確認。


コムラサキ *Callicarpa dichotoma*

絶滅危惧種

クマツヅラ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：-

形態の特徴 高さ 1~2m の落葉低木。葉は単葉で対生する。葉の表面は緑色で毛は少ないが全面にある。葉縁は上部に不整の粗い鋸歯がある。枝は細く紫色をし、はじめは花序の柄とともに星状毛があるが、後には無毛となる。花序は 10~20 花をつけ、腋芽から離れて出る。果実は球形、紫色。まれに白色になるものもある。花期は 6~7 月。園芸店ではムラサキシキブの名で販売されている。



生育環境 湿地の緑などに生育する。市内では荒神山麓で自生地を確認。

ジロボウエンゴサク *Corydalis decumbens*


絶滅危惧種

ケシ科

滋賀県：要注目種 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ 10~20cm の多年草。地下に直径 1cm のまるい塊茎があり、数個の根生葉と花茎をだす。葉は 2 回 3 出羽状に分裂し、茎葉はふつう 2 個つく。総状花序は数個つき花は紅紫色。花期は 4 月。近似種のヤマエンゴサクやヒメエンゴサクは、塊茎からは 1 個の花茎のみを出す。

生育環境 シイ・カシ帯(暖帯)の草地、石垣、林縁などに生育する。市内では彦根城で確認。




イヌノフグリ *Veronica polita var. lilacina*

絶滅危惧種

ゴマノハグサ科

滋賀県：要注目種 近畿：準絶滅危惧種 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 茎は下部で枝分かれして横に広がる。葉は茎の下部で対生し、上部では互生する。卵円形で 4~8 個の鋸歯がある。花冠は小さく淡い紅色で紅紫色のすじがある。花期は 4~5 月。果実は平たい球形で、中央がくびれ上部両端が丸い。オオイヌノフグリは果実の両端がややとがる。



生育環境 畑や道ばた、石垣の間などに見られる。市内では市街地の路傍や空地で確認。

コシオガマ *Phtheirospermum japonicum*


絶滅危惧種

ゴマノハグサ科

滋賀県：希少種 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ 20～70cm の半寄生の 1 年草。全体にやわらかな腺毛が密生し、さわるとベタベタする。葉は対生し、三角状卵形で羽状に裂ける。裂片はさらに不規則に裂け、不ぞろいなとがった鋸歯がある。9～10 月に葉腋に淡紅紫色の花をつける。シオガマギクには腺毛がない。

生育環境 日当たりの良い草地に生育する。河川敷に生育することもある。市内では佐和山で確認。



ヌマゼリ *Sium suave var. nipponicum*


絶滅危惧種

セリ科

滋賀県：絶滅危惧種 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 B 類

形態の特徴 高さ 60～100cm。茎は中空で多くの枝を出す。葉は奇数の一回羽状複葉で側小葉は 2～5 対。7～9 月に枝先に散形花序を出し、白色の花をつける。ムカゴニンジンの側小葉は 1～2 対で、葉腋にムカゴができる。

生育環境 湿地に生育している。市内では内湖で確認。



クルマシダ *Asplenium wrightii*

絶滅危惧種


チャセンシダ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 常緑性のシダ植物。葉は全長 40～100cm で、単羽状となり、叢生する。葉は濃緑色でやや厚く、光沢がある。羽片は 15～20 対で、先はやや鎌状となり、鋸歯がある。胞子のう群は線形で羽軸と辺縁との間に生じる。

生育環境 暖帯～熱帯にかけてのやや湿った樹林内の斜面や岩上に生育する。市内では佐和山山麓で 1 株のみ確認。

備考 県内で本種が確認されたのは彦根市のみである。



ヤナギスブタ *Blyxa japonica*


絶滅危惧種

トチカガミ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 沈水性の1年生草本。細い茎に紫褐色の葉が多数互生する。葉は線形で、長さ10~30cm、幅5~8mm、縁に細かい鋸歯がある。7~10月に葉の間から白色の花をつける。花の下部の細長い筒状の部分は、子房で膜質の鞘包に包まれている。種子の両端には尾状突起がある。

生育環境 水田やその周辺の小水路に生育する。市内では、東部の丘陵地で確認。



ホシクサ *Eriocaulon cinereum*


絶滅危惧種

ホシクサ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種C 国： -

形態の特徴 湿地性の1年生草本。花茎は高さ5~15cm。多数の葉を根生し、葉は長さ2~8cm、幅1~2mm。8~10月に茎の先端にくすんだ白色の頭状花序をつける。総苞片は短い。

生育環境 水辺や湿地、水田に生育する。市内では東部丘陵地や松原干拓地の水田で確認。



マツバラン *Psilotum nudum*


絶滅危惧種

マツバラン科

滋賀県：絶滅危惧種 近畿：準絶滅危惧種 国：絶滅危惧類

形態の特徴 常緑性の多年生シダ植物。根はなく、葉もない。茎は地下茎と地上茎に分かれる。地下茎は叉状に分かれ、褐色毛状の仮根を密生する。地上茎は高さ10~30cmで、叉状に数回分枝し、鱗片状の小突起が散生する。胞子のう群はごく短い側枝上につき、はじめ緑色であるが、熟すと黄色になる。

生育環境 木の幹や岩上に着生する。市内では佐和山山麓などで確認。



ハマエンドウ *Lathyrus japonicus*


絶滅危惧種

マメ科

滋賀県：絶滅危惧種 近畿： - 国： -

形態の特徴 多年生草本。全体に粉白色を帯びる。茎は地上をはい、長さは1mに達し、先端は斜上する。葉は偶数羽状複葉で、先端は巻ひげになる。小葉は8~12枚。托葉は大型で小葉と同大。4~5月に総状花序をつける。花は紫色で、1つの花序に3~6個つける。

生育環境 海岸の砂地に生育する。市内では南部の湖岸で確認。



マキエハギ *Lespedeza virgata*


絶滅危惧種

マメ科

滋賀県：要注目種 近畿：絶滅危惧種 C 国： -

形態の特徴 落葉性の小低木。茎は細くて硬く、高さ40~60cmとなる。葉は3小葉からなり、互生する。8~9月に細くて長い柄の先に総状花序をつける。花序は2~5個の花からなり、花は淡紅紫色。

生育環境 日当たりのよい乾いた草地や林縁に生育する。市内では東部の山地で確認。



チダケサシ *Astilbe microphylla*


絶滅危惧種

ユキノシタ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ30~80cmの多年草。茎や葉柄には褐色の長い毛がある。葉は2~4回奇数羽状複葉。小葉は卵形または倒卵形で先はとがらず、縁に重鋸歯がある。花序は細長い円錐状で側枝は短く、斜上する。花は淡紅色である。花期は6月。

生育環境 山野のやや湿ったところに生育する。市内では東部の丘陵地で確認。



コオニユリ *Lilium leichtliuii var. maximowiczii*


絶滅危惧種

ユリ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 1~2m になる宿根草。長い匍枝をひく。葉腋に珠芽がつかず、花も小型でよく結実する。花は橙紅色で濃い斑点がある。花期は 7 月。オニユリは鱗片が大きく、葉腋に珠芽がつく。

生育環境 山地草原に生育する。市内では荒神山で確認。



カワラアカザ *Chenopodium virgatum*


危急種

アカザ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 30~60cm の一年草。葉は互生し、長さ 2.5~6cm の広線形~長卵形でやや厚く、ふちに半透明の膜質の縁取りがある。花序は細長く、ほとんど枝を分けない。また、花序には透明な円柱状の毛がある。花期は 6~8 月。シロザに似ているが、シロザの葉には鋸歯があり、葉の縁には膜質の縁取りがない。また、下方の葉は全縁である。

生育環境 河原や湖岸の砂地に生育する。市内では南部の湖岸で確認。



イヌナズナ *Draba nemorosa*


危急種

アブラナ科

滋賀県：希少種 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 10~20cm の 2 年草。茎や葉には単毛と星状毛が多い。根生葉は長さ 2~4cm のへら状長楕円形で、茎葉は長さ 1~3cm の狭長楕円形で粗い鋸歯がある。花序は総状で黄色の小花をつける。果実は扁平で短毛がある。花期は 4 月。イヌガラシの果実は円柱形で根生葉は無毛。シロイヌナズナは花は白色で、果実は円柱状である。

生育環境 乾いた畑や土手などに生える。市内では湖岸の砂質の草地や墓地などで確認。



タチスズシロソウ


Arabis kawasakiana

危急種

アブラナ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ 15～40cm で、全体に緑白色を帯びる。根生葉はへら状で、鋸歯があり、両面に軟毛と叉状毛がある。3 月下旬～5 月にかけて白色の花をつける。1 年草。果実は 2～4cm。種子は 1mm。シロイヌナズナ（帰化植物）に似るが、後者は根生葉に単純毛と叉状毛のほかに星状毛が混生し、果実は短く 1～1.5cm で、種子は 0.5mm。



生育環境 湖岸の砂地に生育する。

備考 分布は東海（愛知・三重）近畿（滋賀）四国（愛媛・高知）

アゼテンツキ


Fimbristylis squarrosa

危急種

カヤツリグサ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 A 国：-

形態の特徴 高さ 7～10cm で、葉は短く鞘には毛がある。小穂の幅は 1～1.5mm と小さい。小穂の鱗片の先は長い芒となる。メアゼテンツキやコアゼテンツキは鱗片の芒が長く伸びない。



生育環境 山麓の水田などに生育する。市内では原町などの休耕田で確認。

シロガヤツリ


Cyperus pacificus

危急種

カヤツリグサ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種 A 国：-

形態の特徴 高さ 3～20cm。花序は長さ幅ともに 5～10mm。小穂の鱗片はやや螺旋状か不明な 2 列に並んでいる。果は楕円形～披針形で翼がある。ヒメアオガヤツリは小穂の鱗片は 2 列で、果の辺縁は鋭形で翼はない。



生育環境 平地の湿地や水田、休耕田などに生育する。市内では、松原干拓地において確認。


タカネマスクサ *Carex planate*
カヤツリグサ科

危急種

滋賀県：希少種 近畿： - 国： -

形態の特徴 茎は高さ 30～60cm で叢生する多年生草本。小穂は卵形で 2～5 個がまばらにつく。果胞は広楕円形で扁平し、幅広い翼がある。近似種のヤブスゲの果胞は広披針形～卵形で翼は狭い。

生育環境 森林または林縁の湿地や放棄水田に生育する。市内では東部の丘陵地で確認。




マメスゲ *Carex pudica*
カヤツリグサ科

危急種

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国： -

形態の特徴 茎はごく短く、茎頂に長柄がある長さ 5mm の雄小穂を 1 個つける。側生する雌小穂はほぼ根生する。果胞には少し短軟毛がある。

生育環境 湿原の縁や林下に生育する。市内では東部の丘陵地の湿地の縁で確認。




サワギキョウ *Lobelia sessilifolia*
キキョウ科

危急種

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 茎は円柱形で中空、直立して高さ 0.5～1m になり、枝分かれしない。葉は多数互生し、披針形で先は鋭く、ふちに細かい鋸歯がある。茎上部に総状花序をだし、濃紫色の花が多数つく。花冠は長さ約 3cm の唇形で上唇は 2 深裂し、下唇は 3 浅裂する。花期は 8～9 月。

生育環境 山野の湿地に生育し、しばしば群生する。市内では東部の丘陵地の湿地でのみ確認。



オギノツメ *Hydrophila salicifolia*


危急種

キツネノマゴ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 30～60cm。地下茎は横にはい、節から多数の根と地上茎をだす。地上茎は直立し、無毛である。葉は対生し、披針形で細長い。葉腋に柄のない数個の花を束生する。花は淡紫色で、花期は 9 月。

生育環境 湿地や水田の畦などに生える。市内では、内湖で確認。



アズマイチゲ *Anemone raddeana*


危急種

キンポウゲ科

滋賀県：その他重要種 近畿：準絶滅危惧種 国： -

形態の特徴 高さ 15～20cm の多年草。根生葉は 1～2 回 3 出複葉で、小葉は深く切れ込む。茎葉は 3 個輪生し、3 出複葉で小葉の先に鋸歯がある。直径 2～3cm の白色の花を 1 個頂生する。裏面はすこし紫色を帯び、紅紫色を帯びるものもある。花期は 4 月。早春に現われ、初夏には枯れる早春植物（スプリングエフェメラル）。本種の小葉は羽状に分裂しないが、キクザキイチゲの小葉は羽状に分裂する。

生育環境 ブナ林やミズナラ林などの林縁や林床に生育する。市内では東部の山地で確認。



カリガネソウ *Caryopteris divaricata*


危急種

クマツツラ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 茎は四角形で直立し、上部で枝分かれます。強い臭気がある。葉は対生し、広卵形で鋸歯があり、先は鋭くとがり、基部は円形である。葉腋から長い柄を持つ集散花序をだし、青紫色の花をつける。花期は 8 月。

生育環境 シイ・カシ帯からブナ帯にかけての林縁や林床に生育する。市内では東部の山地で確認。



クチナシグサ *Monochasma sheareri*


危急種

ゴマノハグサ科

滋賀県：分布上重要種 近畿：- 国：-

形態の特徴 茎は斜上し、長さ 15～60cm になる。葉は単葉で互生し、上部の葉は線状へら形で先はとがる。花は 5～6 月に葉腋につき淡紅色。半寄生の 2 年草。

生育環境 日当たりのよい草地や林内に生育する。市内では東部の丘陵地で確認。



ヤナギトラノオ *Lysimachia thyrsiflora*


危急種

サクラソウ科

滋賀県：分布上重要種 近畿：絶滅危惧種 B 国：-

形態の特徴 高さ 30～70cm の多年草。葉は対生し、柄がなく披針形である。6 月に葉腋から柄のある短い円筒形の花序を出し、多数の小さな黄色の花をつける。クサレダマは花序を枝先に円錐状につける。

生育環境 北半球の寒帯の湿地に生育する。市内では内湖で確認。



ヒメナミキ *Scutellaria dependens*


危急種

シソ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：-

形態の特徴 高さ 10～50cm の多年草。方形の茎を分枝し、6～7 月に葉腋に小さな白色の唇形花をつける。葉は対生し、狭卵状三角形で少数の鋸歯をもち、茎とともに無毛である。

生育環境 山麓の湿地などに生育する。市内では内湖で確認。



ミゾコウジュ *Salvia plebeia*


危急種

シソ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種 C 国：準絶滅危惧

形態の特徴 高さ 30～70cm の 2 年草。茎の稜には下向きに毛がある。根生葉は冬にロゼット状に広がるが、5～6 月の花期には枯れる。茎葉は対生し、長楕円形で表面は脈がへこみ、細かいしわが目立つ。枝先に花穂を出し、淡紫色の小さな花を多数つける。イヌコウジュは 9～10 月に花を咲かせ、トウバナの茎の高さは 10～30cm である。

生育環境 河口付近などのやや湿った道ばたに生育する。市内では犬上川河口で確認。



ムカゴニンジン *Sium sisarum*


危急種

セリ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 30～100cm の多年草。茎はよく分枝する。上部の葉は 3 出複葉、下部の葉は単羽状複葉である。側小葉は 1～2 対。8～9 月に枝先に散形花序をだし、白色の花をつける。葉腋にムカゴができる。

生育環境 湿地や水中で生育する。市内では東部の丘陵地で確認。



サデクサ *Persicaria maackiana*


危急種

タデ科

滋賀県： - 近畿：絶滅危惧種 C 国： -

形態の特徴 高さ 0.3～1m の 1 年草。茎に下向きの鋭い刺がある。葉は互生し、ほこ形で基部は耳状に左右にはりだす。葉の両面には星状毛がある。托葉鞘の上部は葉状に広がり、ふちには深い歯牙があり、先端は糸状になる。8～10 月に白色の小さな花が 2～5 個ずつ集まってつく。

生育環境 ヨシ原のある湿地などに生育する。市内では内湖と松原干拓地で確認。



ナガバノウナギツカミ

Persicaria hastato sagittata


危急種

タデ科

滋賀県：希少種 近畿：絶滅危惧種 C 国：-

形態の特徴 高さ 30～100cm の 1 年草。茎には逆刺があり、下部は地面をはう。葉は互生し、卵状披針形～披針形で、基部はほこ形にはりだす。9～10 月に紅紫色の花をつける。花は枝先に数個集まり、花柄や小花柄には細毛と腺毛がある。類似種が多い。

生育環境 ヨシ原などのある水辺に生育する。市内では内湖で確認。



マダイオウ

Rumex madaio


危急種

タデ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種 A 国：-

形態の特徴 高さ 70～150cm の多年生草本。根生葉は卵状長楕円形で、基部は心形、下面脈状に短毛が密に生える。円錐形状に花序をつける。果時の翼状がく片（内花被）は鋸歯があり、中脈はほとんど膨らまない。ノダイオウは翼状がく片（内花被）に鋸歯はほとんどない。エゾノギシギシの翼状がく片（内花被）には著しい刺がある。

生育環境 湿ったところに生育する。市内では東部の山地で確認。



コヒロハハナヤスリ

Ophioglossum petiolatum


危急種

ハナヤスリ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ 8～25cm の夏緑性シダ植物。栄養葉は広卵形～長楕円形、長さ 1～6cm、幅 1～3cm、基部は急に狭くなって柄がある。胞子のう穂は長さ 2～4.5cm。生育期間は 4～11 月。

生育環境 山麓、原野などに生育する。市内では古沢町と小野町で確認。



ミズトンボ

Habenaria sagittifera


危急種

ラン科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ 40～70cm となる多年草。茎は 3 稜形で、地下に直径 1～2cm の球茎をつくる。葉は線形で、茎の下半分に互生する。7～9 月に茎の上部に 10 個前後の花からなる総状花序をつける。花は淡緑色で苞は線状披針形。

生育環境 日当たりのよい湿地に生育する。市内では東部の丘陵地で確認。



カキツバタ

Iris laevigata

希少種


アヤメ科

滋賀県：保全すべき群集・群落・個体群 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 地下茎は横走して群生する。葉は長さ 30～60cm、幅 2～3cm で中脈は目立たない。花茎は高さ 30～90cm。5～6 月に紫色の花を 2～3 個つける。外花被片の中央から基部にかけて白色の筋があるのが特徴。多年草。

生育環境 水湿地に生育する。市内では、内湖と東部の丘陵地の放棄水田で確認。

備考 滋賀県ではカキツバタ群落を保全すべき群集・群落・個体群として指定している。



ノハナショウブ

Iris ensata var. spontanea


希少種

アヤメ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：-

形態の特徴 地下茎は横走して群生する。葉は剣状で太い中脈が隆起して目立ち、長さ 30～60cm、幅 5～12mm である。6～7 月に赤紫色の花をつける。外花被片は楕円形で先が垂れ、中央から基部にかけて黄色の筋がある。多年草。

生育環境 日当たりのよい湿地や湿った草原に生育する。市内では東部の丘陵地の放棄水田や湿地で確認。




アゼガヤ *Leptochloa chinensis*
イネ科

希少種

滋賀県：その他重要種 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 30～70cm の 1 年草で、花序の長さは 15～40cm。花序の枝は開出し、赤紫色を帯びた小穂が片側にかたよって 2 列に並ぶ。小穂は長さ 2.5～3mm で 5～7 個の小花がつく。トダシバには鱗片におおわれた長い地下茎があるが、アゼガヤには地下茎がない。

生育環境 田のあぜや溝のふちなどの湿ったところに生える。市内では三津屋町などの水田のあぜで確認。




オガルカヤ *Cymbopogon tortilis var. goeringii*
イネ科

希少種

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 50～100cm になる多年草。8～11 月に葉状の苞の中から短い枝を側生し、枝の先は左右に分かれ、数個の小穂が密接して総をつくる。総は粉白色で一部赤褐色を帯び、左右の総が 180 度開くのが特徴。

生育環境 丘陵地の草地や土手に生育する。市内では東部の丘陵地で確認。




ヒメコヌカグサ *Agrostis nipponensis*
イネ科

希少種

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：準絶滅危惧

形態の特徴 稈は多数叢生し、高さ 40～80cm で軟らかく細い。花序は大きい円錐形で長さ 10～17cm。枝は斜めに開出し、小穂は全体的に均等に分散してつき、淡緑色で紫褐色を帯びる。ヤマヌカボやコヌカグサは第 1 包穎、第 2 包穎に比較して外穎が小さいが、本種は外穎が包穎より長く、少し突き出て見える。

生育環境 湿地に生える。市内では荒神山や東部の丘陵地で確認。



ウマノスズクサ *Aristolochia debilis*


希少種

ウマノスズクサ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 7～8月に筒状の花を葉腋から1個ずつつける。多年生のつる植物。果実が熟すと基部から6裂し、果柄も糸状に6裂してぶら下がる。全体に無毛で粉白を帯びる。茎は細く丈夫でよく分枝し、他の木や草にからみつく。葉は互生し、長さ4～7cmの三角状卵形。

生育環境 川の土手や畑、林の縁などに生える。市内では、芹川の土手、彦根城の堀ばたなどで確認。



カタキノデ *Polystichum makinoi*


希少種

オシダ科

滋賀県：希少種 近畿： - 国： -

形態の特徴 葉は40～80cmに達する。葉柄下部の鱗片は被針形から広被針形で黒褐色で硬く光沢がある。鱗片の片縁は全縁に近く、長い毛状突起がある。葉の表面に光沢がある。サイゴクキノデは、葉の表面および鱗片に光沢がない。

生育環境 山地の樹林の林床に生育する。市内では東部の山地で確認。



ギフベニシダ *Dryopteris kinkiensis*


希少種

オシダ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 常緑性のシダ植物。葉身は暗緑色で少し光沢があり、長楕円形で長さに対して幅が狭い。サイコクベニシダに似るが、葉柄や中軸の鱗片は灰褐色で、量的には少ない。

生育環境 低山地の林縁や石垣などに生育する。市内では愛知川の堤防や鳥居本町で確認。



ヒロハヤブソテツ *Cytomium macrophyllum*


希少種

オシダ科

滋賀県：希少種 近畿： - 国： -

形態の特徴 頂羽片や羽片の幅が広く、先端以外は丸みをおびる。羽辺の数が少なく 10 対以下で革質、孢子嚢群は散生する。ヤマヤブソテツは、羽辺の幅が狭く、葉の数も 10 対以上と多い。

生育環境 山地の樹林内に生育する。市内では東部の山地で確認。



オミナエシ *Patrinia scabiosaefolia*

希少種


オミナエシ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 60～100cm の多年草。茎の上部はよく分枝し、黄色の花をつける。葉は対生し、羽状に裂ける。果実は長さ 3～4mm の長楕円形でやや平たくなっている。オトコエシの花は白色で、散房状に多数つき、果実は倒卵形で円心形の翼がある。花期は 8～10 月。

生育環境 日当たりのよい山野の草地に生える。市内では東部の山地・丘陵地で確認。

備考 秋の七草。



ウリカワ *Sagittaria pygmaea*


希少種

オモダカ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 湿地性の多年生草本。地中に匍枝をのびし、先端に小さな塊茎をつくってふえる。葉は根生し、柄はなく、下部はやや多肉質で白っぽい。花茎は高さ 10～30cm になり、8～10 月に白い花を 1～2 段輪生する。上部に雄花が下部に雌花がつく。そう果は扁平な広倒卵形で数多く集まってつく。

生育環境 水田や沼などに生育する。市内では大藪町や松原干拓地などの湿田で確認。



ミツデカエデ *Acer cissifolium*


希少種

カエデ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 樹高 15～20m の落葉高木。葉は 3 出複葉で対生する。小葉の表面は濃緑色、裏面は緑色で、表裏面ともに毛がある。縁は長い毛と中上部に粗い鋸歯がある。基部はくさび形である。

生育環境 山地の落葉広葉樹林に生える。市内では東部の山地で確認。



アズマカモメヅル *Cynanchum sub lanceolatum f. albiflorum*

希少種


ガガイモ科

滋賀県：希少種 近畿：絶滅危惧種 C 国： -

形態の特徴 つる性の多年草。葉は細長くて対生し、長さ 7～15mm の柄があり、葉身は長さ 3～11cm、幅 1～2.5cm の披針形または広披針形である。花序は葉腋に生じ、クリーム色の花をつける。花期は 7～9 月。

生育環境 山麓の湿地などで、ヨシなどの高茎植物の茎に巻きついて生育する。市内では内湖と東部の丘陵地で確認。

備考 本種はコバノカモメヅルと混生する。



アオバスゲ *Carex insaniae var. papillaticulmis*


希少種

カヤツリグサ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 5～40cm になる多年草。葉は常緑でやや硬く、幅 4～8mm。雄小穂の鱗片は一部赤色を帯びる。雌小穂の鱗片は緑色の中肋がある。果胞は微卵形で緑色で有毛、嘴は長く口部は鋭 2 歯となる。

生育環境 主にブナ帯の樹林内に生育する。市内では佐和山と東部の山地で確認。




ウマスゲ *Carex idzuroei*

希少種

カヤツリグサ科

滋賀県：希少種 近畿：絶滅危惧種 B 国：-

形態の特徴 高さ 40～60cm になる多年草。匍匐根茎を伸ばし群生する。葉は幅 4～8mm、基部の鞘は淡色で一部暗赤色を帯びる。雄小穂は線形で長さ 2～4cm、雌小穂は 2～3 個つき、長さ 1.5～3cm。果胞は長さ約 10mm、狭卵形、先は長い嘴となる。鱗片は果胞の約半分の長さで、芒がない。花期は 4～5 月。



生育環境 県内ではヨシ原などの湿地に生育する。市内では、水辺の湿地で確認された。


オオシロガヤツリ *Cyperus nipponicus var. spiralis*

希少種

カヤツリグサ科

滋賀県：希少種 近畿：絶滅危惧種 C 国：-

形態の特徴 茎は高さ 10～25cm になる 1 年生草本。花序は頭状で小穂は披針形で、長さ 3～7cm、幅 1.5～2cm。アオガヤツリに似るが、小穂の鱗片はらせん状につくため、小穂は扁平とならない。



生育環境 ため池の岸や湖岸、水田などに生育する。市内では新海町などの休耕田で確認。


タイワンヤマイ *Scirpus wallichii*

希少種

カヤツリグサ科

滋賀県：その他重要種 近畿：- 国：-

形態の特徴 桿は高さ 15～40cm で細く、幅は 0.7～1mm。小穂は披針形で先はとがっている。鱗片は先がとがり、刺針状花被片は果体の 2 倍長。イヌホタルイは茎は太く 1.5～7mm、小穂は長楕円形で先はとがらず、刺針状花被片は果とほぼ同長。



生育環境 湿地に生育する。市内では新海町などの水田で確認。

ヒメアオガヤツリ *Cyperus extremiorientalis*


希少種

カヤツリグサ科

滋賀県：希少種 近畿： - 国： -

形態の特徴 棹の高さは3~20cm。小穂の鱗片は2列生、柱頭は2個、果実の縁は翼状にならない。シロガヤツリは果実の縁が翼状になる。

生育環境 湿った平地や水田に生える。水位変動がある水際に生育する。市内では松原干拓地で確認。



マツカサススキ *Scirpus mitsukurianus*


希少種

カヤツリグサ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種C 国： -

形態の特徴 高さ1~1.5m。茎は鈍い3稜形で、5~7個の節がある。葉はかたく、互生し、狭長な線形で、葉鞘は茎を包む。茎の先や葉腋から花序の枝を出し、10~20個の小穂が球状に集まった花穂を散房状につける。コマツカサススキの花穂は茎の先に数個、葉腋には1~2個と少ない。

生育環境 日当たりのよい湿地に生育する。市内では犬上川の河口や野田山町などの休耕田で確認。



マツバスゲ *Carex biwensis*


希少種

カヤツリグサ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ10~40cmの多年草である。茎は直径約1mmと細く、葉は幅約1.5mmの細い線形。茎の先に長さ1~2cmの小穂を1個つける。果胞は1.5~2mmで、水平に開出し、鱗片とほぼ同じ長さでふくらんだ広卵形である。

生育環境 湿地に生育する。市内では東部の丘陵地の水田のあぜで確認。



コヤブタバコ *Carpesium cernuum*


希少種

キク科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 0.5～1m の 2 年草。茎は太く、枝分かれし、下部には白い軟毛が密生する。根生葉はさじ形で、花の時期にはない。葉の縁は不ぞろいの鋸歯があり、両面とも白い軟毛が生える。頭花は直径 15mm 以上あり点頭する。花期は 7～9 月。

生育環境 やや日陰の林縁に生育する。市内では雨壺山など数ヶ所で確認。



タウコギ *Bidens tripartite*


希少種

キク科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 0.2～1.5m の一年草。葉は対生し、3～5 深裂し、裂片のふちには鈍い鋸歯がある。茎の上部のものは単葉で裂けない。頭花は黄色で枝先に 1 個ずつつく。頭花は筒状花のみで舌状花はない。花期は 8～10 月。

生育環境 水田や川岸などに生育する。市内では、松原干拓地や東部の丘陵地の水田で確認。



トウゴクサバノオ *Dichocarpum trachyspermum*


希少種

キンポウゲ科

滋賀県：分布上重要種 近畿： - 国： -

形態の特徴 10～20cm の多年草。走出枝はなく、葉は 3 出複葉で対生する。本種の花の色は淡黄色で茎と葉に毛はない。サバノオの花は白く、茎と葉にまばらな毛がある。シロツルカネソウは走出枝があり、花は白く、茎と葉に毛はない。花期は 4 月。

生育環境 山地の湿潤な林内に生育する。市内では東部の山地で確認。



フクジュソウ *Adonis ramosa*


希少種

キンボウゲ科

滋賀県：分布上重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ 10～30cm の多年草。根茎は黒褐色で太く、多数のひげ根を束生する。葉は互生して 3～4 回羽状に細裂する。枝先に黄色い花を 1 個～数个つける。20～30 個の花弁と暗緑紫色を帯びた数個の萼片がある。花期は 4 月。

生育環境 プナやミズナラなどの落葉樹林の林床に生育する。石灰岩地に生育していることも多い。市内では東部の山地で確認。



ハマゴウ *Vitex rotundifolia*


希少種

クマツヅラ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ 30～60cm の落葉低木。幹は長く砂中を横にはう。葉は対生し、広卵形～楕円形で、裏面は灰白色で微細な毛が密生する。円錐花序が茎の頂につき、花冠は青紫色となる。花期は 8～9 月。

生育環境 海岸の砂地に生育する。市内では南部の湖岸で確認。



オオイタビ *Ficus pumila*


希少種

クワ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 常緑つる性木本。葉は互生し楕円形、成葉は無毛。先端は鈍く、基部は円形で全縁。若い葉も全縁。側脈は 4～5 対あり、主脈から 30～40 度の角度で分枝する。果実は球形から倒卵形で長さ 3.5～5cm。ヒメイタビの葉先はややとがり、葉脈は 5～6 対、主脈から 50～60 度の角度で分枝し、下面脈状に毛がある。若い葉は鋸歯があり、果実は球形で直径 2cm。

生育環境 崖や岩上などに生育する。市内では彦根城内で確認。



アブノメ *Dopatrium junceum*


希少種

ゴマノハグサ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 5~20cm の 1 年草。葉は無柄で対生し、狭長楕円形で先端は鈍く、縁に鋸歯はない。上部の葉ほど小さい。葉腋に淡紫色の唇形花をつける。上唇は 2 裂し、下唇は 3 裂する。花期は 8~9 月。

生育環境 水田などの湿地に生育する。市内では松原干拓地や肥田町の湿潤な水田で確認。



ミズネコノオ *Eustellaris stellata*


希少種

シソ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：準絶滅危惧種 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ 15~50cm の 1 年草。柔らかな茎で、中央付近で多数の枝を出す。葉は 3~6 輪生である。8~10 月に茎頂または枝先に淡紅色または白色の花を穂状につける。ミズトラノオは、多年生草本で地下茎を出す。

生育環境 水田、湿地に生育する。市内では西部の水田や松原干拓地で確認。



オニバス *Euryale ferox*


希少種

スイレン科

滋賀県：絶滅危惧種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 葉は直径 1~2m で、しわが目立つ。8 月~9 月ごろに紫色の花をつける。本種は水面に葉を広げ、平らであり、するどいトゲがある。ハスは水面から突き出る葉を持ち、真中がへこみ、皿のようになっていて、トゲはない。

生育環境 泥の多い池や沼地に生育する。市内では彦根城の堀で確認。



ヒメコウホネ


Nuphar subintegerrimum

希少種

スイレン科

滋賀県：要注目種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 多年生の浮葉植物であるが、沈水葉を持つ。沈水葉は膜質で波打ち、広卵形である。浮葉は沈水葉に比べ質が厚く、広卵形から円心形である。6～9月に長い花茎を水面から抽出し、黄色の花をつける。柱頭の先は鈍頭で柱頭盤から突き出ない。白く太い地下茎が横にはう。本種は浮葉となり、コウホネは抽水葉となるが、本種も水位が低下すると抽水状態となる。また、コウホネの柱頭の先は鋭頭で柱頭盤から突き出て歯牙状となる。



生育環境 湖沼やため池、水路などに生育する。市内では琵琶湖近くの河川や水路で確認。

備考 関西地方の大形のヒメコウホネについてはコウホネとの雑種とする説があり、市内に分布する本種についても今後検討を要する。

ヤマドリゼンマイ


Osmunda cinnamomea var. fokiensis

希少種

ゼンマイ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ40～80cmの夏緑性のシダ植物。栄養葉と孢子葉の2形性をなす。栄養葉は単羽状深裂し、裂片は鈍頭で全縁。孢子葉は栄養葉よりも早く出て、孢子が散ってからのおち夏までに枯れる。



生育環境 多くはブナ帯の湿原に生育するが、県下では低山地の谷筋や湿原にも生育することがあるが、市内では佐和山の西側の谷筋で確認。

イヌタヌキモ


Utricularia tenuicaulis

希少種

タヌキモ科

滋賀県：希少種 近畿：- 国：-

形態の特徴 浮遊性の多年草。茎は細く、長いもので約1mに達するが切れやすい。葉は基部で2本の枝に分かれ、さらに二叉状に分枝する。葉には多数の捕虫のうがつく。7～9月に花茎を水面上に出し、先端に数個の黄色の花をつける。距は下唇より短く鈍頭。夏～秋に側枝の先端に長楕円形で暗褐色をした殖芽（越冬芽）を形成する。



生育環境 ため池や水田などに生育する。市内では東部の丘陵地で確認。

ノウルシ *Euphorbia adenochlora*


希少種

トウダイグサ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 茎は太く、高さ 30～40cm になる。葉は互生し、長楕円形で裏面に短い軟毛がある。茎の先に葉を 5 個輪生し、4～5 月にそれぞれの葉腋から出た枝の先に杯状花序をつける。花序の基部の卵円形の総苞葉は鮮やかな黄色である。

生育環境 川岸や湖岸などの湿地に生育する。市内では湖岸の水湿地や内湖畔で確認。



ハンゲシヨウ *Saururus chinensis*


希少種

ドクダミ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ 0.6～1m の多年草。葉は互生し、卵状心形で、花が開くころに茎の上部の葉は白くなり、8 月ごろに再び淡緑色となる。上部の葉腋から花穂を出し、小さな花を多数つける。

生育環境 水辺や湿地に生育する。市内では内湖で確認。



トチカガミ *Hydrocharis dubia*


希少種

トチカガミ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：-

形態の特徴 水面に浮遊する多年生草本。水中を横にのびる匍枝がある。葉は長い柄があり、水面に浮かぶ。葉身は円形で基部は心形となっている。裏面にスポンジ状にふくらんだ気泡がある。花弁は 3 個で白色、1 日でしぼむ。花期は 8～10 月。冬は水中茎の先端が長さ 2～4cm の殖芽（越冬芽）となり、水中に沈んで越冬する。

生育環境 琵琶湖岸やため池、水路で生育する。市内では新海町の水路や漁港、旧彦根港などで確認。



オオマルバノホロシ *Solanum megacarpum*


希少種

ナス科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：-

形態の特徴 つる性の多年草。葉は狭卵形または卵形で薄質、鋭頭、全縁で縁に短毛が生え、基部は微心形である。8~9月に節間の途中で花序をつかってまばらに花をつける。花冠は淡紫色である。液果は楕円形で紅色に熟す。

生育環境 湖岸や河川敷、内湖の低湿原など湿ったところで生育する。市内では、湖岸や芹川・犬上川の河口、内湖などで確認。



ハマハナヤスリ *Ophioglossum thermale*


希少種

ハナヤスリ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ7~25cmとなる夏緑性のシダ植物。栄養葉は長さ0.7~5cm、幅0.3~2cmで線形から卵形、無柄で基部はしだいに狭くなって孢子葉の柄と合体する。

生育環境 砂浜や日当たりのよい湿地に生育する。市内では八坂町で確認。



オオトックリイチゴ *Rubus × hiraseanus*

希少種


バラ科

滋賀県：絶滅危惧種 近畿：- 国：-

形態の特徴 花序の下の葉は5または7個の小葉からなる。小葉の下面は綿毛があり、白色。ナワシロイチゴは花序の下の葉は3個の小葉からなる。トックリイチゴは葉の下面は綿毛がなく、緑色。

生育環境 日当たりの良い林縁部や石垣の下部に生育する。彦根城にのみ生育する。

備考 滋賀県固有種。本種はナワシロイチゴとトックリイチゴ雑種では内科と考えられている。



カワラサイコ *Potentilla chinensis*


希少種

バラ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 A 国：-

形態の特徴 根茎は太く、高さ 30～70cm になる。葉は 15～29 個の小葉からなる奇数羽状複葉である。小葉は羽状に深く裂け、裏面には綿毛が密生する。小葉と小葉の間に小さな裂片がある。花は黄色。

生育環境 日当たりのよい河原や湖岸に生育する。市内では、新海町などの湖岸や犬上川の河原で確認。



ヤマナシ *Pyrus pyrifolia*


希少種

バラ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ 10～15m の落葉小高木。葉は単葉で長枝に互生し、短枝に束生する。葉身は卵形または狭卵形で縁には芒状の鋭い鋸歯がある。4～5月に短枝の先にでた散房花序に白色の花が 5～10 個つく。花柱は 5 個で果実の萼裂片は残存しない。

生育環境 山地に生育する。市内では東部の山地で確認。



ヒルムシロ *Potamogeton distinctus*


希少種

ヒルムシロ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 浮葉性の多年生草本。水中茎は水田に生育するものは短い、水路に生育するものでは 1m 以上になる。沈水葉は披針形で明らかな柄がある。浮水葉は長楕円形で長さ 5～20cm の柄がある。6～10月に浮水葉の基部から柄をのぼし、その先に穂状花序をつける。

生育環境 池沼や水田に生育する。市内では、新海町の水路や笹尾町の水田脇の水路で確認。



ヒロハノエビモ *Potamogeton perfoliatus*


希少種

ヒルムシロ科

滋賀県：分布上重要種 近畿：- 国：-

形態の特徴 沈水性の多年草。葉身は 1.5~9cm、幅 10~25mm で、縁は波打ち微鋸歯縁、基部は茎をだく。6~9月に穂状花序をつける。花被はない。秋になると地下茎の先端が肥大して殖芽となり、越冬する。

生育環境 湖沼に生育する。市内では新海町で確認。



ヤマシャクヤク *Paeonia japonica*


希少種

ボタン科

滋賀県：希少種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ 30~40cm になる多年生草本。葉は 2 回 3 出複葉で互生する。5 月に茎の先端に 1 個の花をつける。花弁は 5~7 枚で白色。

生育環境 主として落葉広葉樹林内に生育する。市内では東部の山地で確認。



カワラケツメイ *Cassia mimosoides ssp. nomame*


希少種

マメ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さ 30~60cm になる 1 年草。葉は偶数羽状複葉で、葉柄の上に密腺が 1 個つく。小葉は線形または線状披針形で、15~35 対。8~10 月に葉腋のやや上に 1~2 花をつける。花は黄色。豆果は扁平な長方形、伏した短毛がある。

生育環境 日当たりのよい川原や土手などに生育する。市内では愛知川河口で確認。



ナツフジ

Milletia japonica


希少種

マメ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 落葉のつる性木本。茎は右巻き（前から見て右から左へ巻きながら登る）で、葉は奇数羽状複葉。花は緑白色で夏に開花する。フジに似るが、フジは5月ごろ紫色の花をつける。

生育環境 山地の林内や林縁に生育する。市内では荒神山とその周辺で確認。



ミクリ

Sparganium erectum ssp. stoloniferum


希少種

ミクリ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 A 国：準絶滅危惧

形態の特徴 高さ 50～120cm になる多年生草本。根茎は横にはう。葉は互生し、幅 7～20mm、裏面に稜があり断面は三角形となる。花序は枝分かれし 2～5 本ある。花期は 6～8 月。ナガエミクリやヤマトミクリの花序は枝分かれない。

生育環境 河川、水路などの流水域に群生することが多い。市内では愛知川などの河川や水路で確認。



ヤマトミクリ

Sparganium fallax


希少種

ミクリ科

滋賀県：分布上重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ 50～120cm となる多年生草本。根茎は横にはう。葉は互生し、幅は 8～15mm、裏面に稜があり、断面は三角形となる。花序は枝分かれない。雌性頭花の柄は主軸と合着して腋上生となる。花期は 7～8 月。ナガエミクリの雌性頭花は主軸と合着しないで腋性となる。

生育環境 ため池などの止水域に生育することが多い。市内では東部の丘陵地の水田跡で確認。



キバナイカリソウ *Epimedium koreanum*


希少種

メギ科

滋賀県：分布上重要種 近畿：準絶滅危惧種 国：-

形態の特徴 高さ 20～40cm となる夏緑性の多年草。葉は2回3出複葉。先は尾状にのびてとがり、縁には多くの刺状の毛がある。花はクリーム色で下を向いて咲き、長い距がある。花期は4～5月。

生育環境 山地の樹林の林床や林縁に生育する。市内では東部の山地で確認。



ウラボシノコギリシダ *Athyrium sheareri*


希少種

メシダ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 常緑性のシダ植物。根茎は長くはい、葉は長さ60cmに達する。単羽状葉で羽片は浅裂～中裂。孢子葉は栄養葉より羽片の幅が狭く、葉柄も長くなる。胞子のう群は裂片と辺縁の中間につく。包膜は円腎形。

生育環境 常緑樹林などの林床に生育する。市内では彦根城や犬上川畔で確認。



セイトカシケシダ *Deparia dimorphophylla*


希少種

メシダ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 落葉性のシダ植物。葉身は厚みがあり、卵状三角形で単羽状。葉の両面、中軸、羽軸は有毛。胞子のう群は中肋に接してつき、苞膜は線形で表面に毛がある。

生育環境 樹林内に生育する。市内では東部の丘陵地で確認。




コブシ *Magnolia praecocissima*
モクレン科

希少種

滋賀県： - 近畿：絶滅危惧種 C 国： -

形態の特徴 落葉高木。葉は互生し、倒卵形で基部はくさび形に細くなる。4月に葉を展開する前に花を開く。通常は花の下に1枚の小さな葉がある。花弁は6個。萼片は3個で、外側に軟毛を密生する。

生育環境 落葉樹林内に生育する。市内では愛知川の河畔林や湖岸で確認。




カラタチバナ *Ardisia crispa*
ヤブコウジ科

希少種

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ1mくらいになる常緑低木。茎は直立し分枝しない。葉は互生し、葉縁に低い波状歯と腺体をもつ。7月ごろに約10個の花からなる散形花序をつける。

生育環境 常緑樹林内に生育する。市内では佐和山で確認。




タコノアシ *Penthorum chinense*
ユキノシタ科

希少種

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ1mほどになる多年草。茎は分枝せず、しばしば淡紅色を帯びる。葉は披針形で互生する。8~9月に花序は茎の上部で数個に分枝して放射状に伸び、花は花軸の上側に列生する。花は淡黄白色で花弁はない。

生育環境 湿った河原などに生える。市内では犬上川の河口や愛知川の河原で確認。



エビネ *Calanthe discolor*


希少種

ラン科

滋賀県：その他重要種 近畿：- 国：絶滅危惧類

形態の特徴 常緑の多年草。偽球茎はじゅず状に連なる。葉は2~3枚で長楕円形、長さ15~25cm、幅5~8cm。4~5月に葉の展開を待たずに1本の花茎を立て、8~15個の花からなる総状花序をつける。花はふつう暗褐色~淡紫褐色（花色は変異が多い。）

生育環境 落葉樹林、杉林、竹林などに群生する。市内では東部の山地、犬上川などで確認。



キンラン *Cephalanthera falcate*


希少種

ラン科

滋賀県：希少種 近畿：絶滅危惧種C 国：絶滅危惧類

形態の特徴 高さ20~70cmとなる多年草。葉は長楕円状披針形で5~8枚が互生し、茎を抱く。葉の裏面は無毛。4~5月に茎頂に3~12個の花からなる総状花序をつける。花は黄色で半開性。萼片は長さ14~17mm。

生育環境 山地や丘陵の明るい落葉広葉樹林内に生育する。市内では佐和山や東部の山地で確認。



ギンラン *Cephalanthera erecta*


希少種

ラン科

滋賀県：希少種 近畿：- 国：-

形態の特徴 高さは10~30cmとなる多年草。葉は長楕円形で3~6枚が互生し、茎を抱く。葉の裏面は無毛。5月に茎頂に数個の花からなる総状花序をつける。花は白色で半開性。萼片は長さ7~9mm。ササバキンランは葉の裏面や辺縁に白色の短毛状突起がある。

生育環境 落葉広葉樹林内に生育することが多い。市内では雨壺山や東部の山地で確認。



クモキリソウ *Liparis kumokiri*


希少種

ラン科

滋賀県：希少種 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 10~20cm となる多年草。茎の基部はふくらんで卵球状の偽球茎となる。葉は楕円形で 2 枚つく。網目模様は目立たない。6 月に茎頂に 5~15 個の花からなる総状花序をつける。花は淡緑色ときに暗紫色。コクランは茎の基部の偽球茎は卵球状とならず円柱形で節がある。

生育環境 やや湿った明るい林内に生育する。市内では東部の山地で確認。



サイハイラン *Cremastra appendiculata*


希少種

ラン科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 30~50cm となる多年草。偽球茎は卵形で、やや離れて横に連なる。葉は長楕円形で 3 本の脈が目立つ。5~6 月に茎頂に総状花序をつける。花序は 8~20 個の淡緑褐色の小花からなる。小花の唇弁には紅紫色の斑紋がはいる。

生育環境 山地や丘陵の樹林内に生育する。市内では佐和山と愛知川の河畔林で確認。



トンボソウ *Tulotis ussuriensis*


希少種

ラン科

滋賀県：その他重要種 近畿：準絶滅危惧種 国： -

形態の特徴 高さ 20~30cm となる多年草。葉は長楕円形で 2 枚。茎の上部に少数の鱗片葉がある。7~8 月に茎の上部に穂状花序をつける。花は黄緑色。苞は狭披針形。

生育環境 谷部の湿った林内に群生することが多い。市内では東部の山地で確認。



ナツエビネ *Calanthe reflexa*


希少種

ラン科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ 20～40cm となる多年草。葉は長楕円形で長さ 10～30cm、幅 3～6cm。7～8月に茎の上部に 8～20 個の花からなる総状花序をつける。花は淡紅紫色。唇弁には距がない。エビネは唇弁に距があり、花期は 4～5 月。

生育環境 落葉樹林内に生育する。市内では佐和山や東部の山地で確認。



レンブクソウ *Adoxa moschatellina*


希少種

レンブクソウ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 8～17cm の多年草。白色の細長い地下茎をのばし、先端に小さな球茎をつくってふえる。根生葉は 2 回 3 出複葉で長い柄がある。小葉は羽状に中裂する。茎葉は小さく 1 対が対生する。4～5 月に黄緑色の花をつける。花は 5 個集まってつく。5 個の花のうち頂生の花は花冠が 4 裂し、側生の花は花冠が 5 または 6 裂する。7 月には地上部は枯れる。

生育環境 山地の林内に生育する。市内では東部の山地や犬上川、愛知川の河畔林で確認。



アカウキクサ *Azolla imbricate*


要注目種

アカウキクサ科

滋賀県：要注目種 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 茎は羽状に分枝し、長さは 1～1.5cm。葉は鱗片状で、表面に粒状の突起がある。根には長い根毛が密生する。全体の形は三角形に近い形となる。オオアカウキクサは葉の表面はほぼ平滑で、根毛はない。

生育環境 水田や池沼に浮遊する多年草。市内では村松七郎(1981)によって佐和山西麓で確認されているが、今回の調査では未確認。



ウスゲチヨウジタデ *Ludwigia decurrens*


要注目種

アカバナ科

滋賀県： - 近畿： - 国：準絶滅危惧

形態の特徴 高さ 25~90cm の 1 年草。チヨウジタデに似るが、多くは全体が緑色で、細かい伏毛が多い。(チヨウジタデは全体が赤味がかかり、無毛のものが多い。)葉腋に黄色の小花をつける。花期は 8~10 月。額片は 5 枚で、チヨウジタデよりやや長い(3~4mm)。(チヨウジタデの額片は 4 枚で長さは 2~3mm)

生育環境 水田、放棄水田、湿地に生える。市内では、松原干拓地で確認。



ヒメコウガイゼキショウ *Juncus bufonius*


要注目種

イグサ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 茎は円柱状で束生し、高さ 10~30cm の 1 年草。葉は細く扁平で溝がある。花期は 5~8 月。花は単生し、花茎と同長かまたはやや長い。さく果は長楕円形で、先端は凹頭、花被片よりも短い。

生育環境 河川敷や休耕田など攪乱間もない湿った砂質地に生える。市内では、愛知川河口で確認。



ウメガサソウ *Chimaphila japonica*


要注目種

イチヤクソウ科

滋賀県：絶滅危惧種 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 5~15cm の常緑の小低木。葉は茎の節に 2~3 個が輪生状につき、長さ 2~3.5cm の披針形でとがった鋸歯がある。6 月ごろにウメのような白い花を茎頂に 1 個つける。

生育環境 やや乾燥した丘陵や山地の林内に生える。市内では東部の丘陵地で確認。



タチクラマゴケ *Selaginella nipponica*


要注目種

イワヒバ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 クラマゴケに似るが、胞子のうをつけた枝は直立し、穂は他の部分とあまり差がない。クラマゴケは胞子のうをつけた枝は頂生し、四角柱のはっきりした穂をつくる。

生育環境 日当たりのよい林床や林縁の斜面に群生する。市内では村松七郎(1981)によって佐和山で確認されているが、今回の調査では未確認。



コシンジュガヤ *Scleria parvula*


要注目種

カヤツリグサ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種 C 国： -

形態の特徴 高さ 30~50cm。葉鞘には常に広い翼がある。小穂は下垂して、果は白色で、格子紋に光沢がある。ミカワシンジュガヤには葉鞘の翼がなく、格子紋に光沢がない。

生育環境 湿地に生育する。村松七郎(1981)により佐和山山麓で確認されているが、今回の調査では未確認。



ヤマジノギク *Heteropappus hispidus*


要注目種

キク科

滋賀県：希少種 近畿： - 国： -

形態の特徴 茎はよく枝分かれし、かたくて粗い毛が生え、高さが 0.3~1m になる。根生葉は花期に枯れてなくなる。葉は倒披針形で両面に毛がある。上部の葉は線形となる。花期は 9~10 月で淡い青紫色の頭花をつける。

生育環境 日当たりの良い山地や丘陵地の林縁に生育する。滋賀県植物誌(1968)に「大堀町芹川河岸」の記録があるが、今回の調査では未確認。



セツブンソウ *Shibateranthis pinnatifida*


要注目種

キンボウゲ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ 5～15cm の多年草。地中に球形の塊茎がある。根生葉は花茎と別にでて長柄があり、葉身は掌状で 3 全裂し、さらに細裂する。茎葉は花茎の上部に 2 個対生し、3 深裂する。茎頂に直径 2cm の白い花を 1 個つける。花期は 3 月。

生育環境 落葉広葉樹林の林縁や林内、土手や水田のあぜにも生育する。石灰岩地に生育することが多い。滋賀県植物誌(1968)に「鳥居本」の記録があるが、今回の調査では未確認。



ハイハマボツス *Samolus parviflorus*


要注目種

サクラソウ科

滋賀県： - 近畿：絶滅危惧種 A 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ 10～30cm になる小形の多年草。葉は倒卵形で長さ 2～6cm、幅 1～2cm。やや薄質で裏面に赤褐色の細点が散在する。6～7 月にまばらな総状花序に 10～20 個の白色の小花をつける。

生育環境 海岸の塩湿地と内陸の池畔に生育する。市内では村松七郎(1981)によって彦根城で確認されているが、今回の調査では未確認。



サンショウモ *Salvinia natans*


要注目種

サンショウモ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種 C 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 一年生の浮遊する植物。葉は 3 輪生で、内 2 枚は対生し浮葉となり、残り 1 枚は水中葉となる。浮葉は長楕円形で、表面には短い刺状の毛のある突起が密にあり、裏面には軟毛がある。水中葉は根のように変化して分かれる。真の根はない。秋に水中葉の基部近くに球形の包膜に包まれた胞子のう群をつける。

生育環境 琵琶湖の漁港周辺や湿地、放棄水田などで確認されている。市内ではかつて犬上川河口に生育していたが、河口の改修工事後見られなくなった。今回の調査では未確認。



ナガバノスミレサイシン *Viola bissetii*


要注目種

スミレ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 根茎はやや細い。葉は三角状長卵形で先は長くとがり、基部は深く湾入する。花は大型、淡紫色で側弁は無毛、唇弁には紫条が入り、距は太く短い。花期は4月。

生育環境 太平洋側の山地の林下に生育する。市内では東部の山地で確認。



オオハナウド *Heracleum dulce*


要注目種

セリ科

滋賀県：要注目種 近畿：絶滅危惧種 A 国： -

形態の特徴 高さ1~2mの多年草。茎や節に毛が密生する。根出葉は3~5小葉からなり、小葉には鋭い裂片や歯牙があり、下面には密に短毛がある。7~8月に枝先に大型の複散形花序を出し、白色の小花を多数つける。ハナウドは、根出葉は5~7小葉からなり、葉の下面は脈状に短毛がある。

生育環境 深山の川岸や草地に生育する。市内では東部の山地で確認。




コギシギシ *Rumex nipponicus*

要注目種

タデ科

滋賀県：要注目種 近畿： - 国：絶滅危惧 類

形態の特徴 高さ30~50cmの多年草。下部の葉は長い柄があり、両面とも無毛である。下葉では基部が円形で長楕円状披針形である。花期は5~6月。果実を包む内花被の中脈にコブ状突起があり、内花被の縁には著しい刺がある。葉や内花被の形状はエゾノギシギシに似るが、エゾノギシギシの葉の下面脈状には突起状の白毛があり、本種の下面は無毛である。



生育環境 川原や日当たりの良い適湿地。滋賀県植物誌(1968)には「千本村大堀、芹川の河原」の記載があるが、今回の調査では未確認。

アカモノ *Gaultheria adenothrix*


要注目種

ツツジ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 高さ 10～30cm の常緑の小低木。若枝は開出する赤褐色の長毛を密生する。葉は互生、卵形、縁には細鋸歯または剛毛がある。上面は無毛、下面は剛毛を散生。6月に枝先に1個の淡紅色の花を下向きにつける。

生育環境 温帯または寒帯の草地、疎林下に生育する。市内ではかつて荒神山の尾根部に生育していたが、今回の調査では未確認。



ケヤマウツボ *Lathraea japonica var. miqueliana*


要注目種

ハマウツボ科

滋賀県：要注目種 近畿：絶滅危惧種 A 国： -

形態の特徴 多年生の寄生植物で、全体はやや褐紫色を帯びた白色。地下茎は密に肉質の鱗片葉がある。地上に直立する高さ 10～30cm の花茎を出し、鱗片葉と軟毛がある。ヤマウツボは地上部に軟毛がないものをいうが、本種と連続する。ケヤマウツボは4月に筒状で白色の花をつける。

生育環境 ブナ科、カバノキ科、ヤナギ科など多くの樹木の根に寄生する。山中のやや湿度の高い落葉樹林内に生育する。



ナガボノワレモコウ *Sanguisorba parviflora*


要注目種

バラ科

滋賀県：その他重要種 近畿：絶滅危惧種 A 国： -

形態の特徴 高さ 80～130cm になる多年草で、根茎は太く、葉を根生する。葉は奇数羽状複葉で 11～15 個の小葉からなる。小葉は細長く、線形～線状長楕円形。9～10月に細い枝の先に円柱形の細長い花穂がつき、垂れ下がる。花は小さく、緑白色または紅紫色である。ワレモコウの花穂は楕円形で、直立し、小葉は丸く楕円形～長楕円形。

生育環境 湿地性の草原に生育している。市内では宮田町で確認。



タヌキマメ *Crotalaria sessiliflora*


要注目種

マメ科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿：絶滅危惧種 C 国：-

形態の特徴 高さ 30～70cm となる 1 年生草本。葉は線形で互生。7～9 月に茎や枝の先端に総状花序をつける。花は青紫色。萼は花後に伸びて、豆果をおおう。

生育環境 日当たりのよい草地や土手に生育する。市内では『湖畔の花と実』(1981)に「曽根沼」の記録があるが、今回の調査では未確認。



コウヤワラビ *Onoclea sensibilis var. interrupta*


要注目種

メシダ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 夏緑性のシダ植物。葉は二形性。栄養葉は単羽状複生で広卵形から三角状楕円形、長さ 8～30cm、幅 8～25cm。羽片は 5～11 対で鈍頭。辺縁は全縁から鈍鋸歯縁。質は草質。孢子葉は 2 回羽状複生で栄養葉とほぼ同じ高さである。裂片が内側に強く曲がって孢子のう群を包み込む。

生育環境 湿った明るい草地や田の畦に群生する。市内では南部の湖岸で確認。



マツグミ *Taxillus kaempferi*


要注目種

ヤドリギ科

滋賀県：- 近畿：- 国：-

形態の特徴 半寄生性の常緑低木。葉は厚くて倒披針形で互生し、葉脈は不明瞭。7～8 月に暗紫色の花をつける。果実は楕円形で赤熟する。

生育環境 モミ、ツガ、アカマツなどの針葉樹に寄生。市内では、彦根城で村松七郎(1981)によって確認されているが、今回の調査では未確認。



アサツキ *Allium schoenoprasum* var. *foliosum*


要注目種

ユキノシタ科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 多年草。鱗茎は狭卵形で淡紫褐色の外皮に包まれている。花茎は高さ 40～60cm になり、2～3 個の葉がつく。葉は茎より短く、細い円筒形で中空。5～6 月に花茎の先に淡紅紫色の花を散形状に多数つける。

生育環境 山野の草地に生育する。『滋賀県植物誌』（1968）に「鳥居本男鬼」の記載があるが、今回の調査では未確認。



アキザキヤツシロラン *Gastrodia verrucosa*


要注目種

ラン科

滋賀県： - 近畿： - 国： -

形態の特徴 腐生植物。10 月に茎をわずかに地上に出し、先に 1～5 花からなる総状花序をつける。花は長さ 1cm 程で平開せず、暗褐色。花後、花柄が急速に伸び 30～40cm に達する。クロヤツシロランの花は平開する。

生育環境 常緑樹林や竹林に生育する。市内では愛知川河畔林で確認。



カヤラン *Sarcochilus japonicus*


要注目種

ラン科

滋賀県：絶滅危機増大種 近畿： - 国： -

形態の特徴 多年草。茎は下垂し、長さ 3～10cm で、節間から気根を出し着生する。葉は 2 列に平たく互生する。4～5 月に葉腋から花茎をのばし、総状花序をつける。花序は 2～5 個の淡黄色の花からなる。

生育環境 サクラ、ウメ、カシ、スギなどさまざまな樹木の幹や枝に着生する。市内では東部の山地で確認。



科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
マツバラシ	マツバラシ		<i>Psilotum nudum</i>		VU	準	I	B	
ヒカゲノカズラ	トウゲシバ		<i>Lycopodium serratum</i>	男鬼町、笹尾町、鳥居本町、宮田町、荒神山					
	ヒカゲノカズラ		<i>Lycopodium clavatum</i>	笹尾町、善谷町、荒神山					
	ホソバトウゲシバ		<i>Lycopodium serratum var. intermedium</i>	笹尾町					
	ミズスギ		<i>Lycopodium cernuum</i>	笹尾町					
イワヒバ	カタヒバ		<i>Selaginella involvens</i>	清崎町					
	クラマゴケ		<i>Selaginella remotifolia</i>	男鬼町、金亀町、荒神山、佐和山、彦根城					
	コンテリクラマゴケ		<i>Selaginella uncinata</i>	荘厳寺町、宮田町、佐和山					帰化
トクサ	イヌドクサ		<i>Equisetum ramosissimum</i>	大塚町、長曾根町、八坂町、松原町、犬上川、芹川					
	オクエソスギナ		<i>Equisetum arvense f. boreale</i>	笹尾町					
	スギナ		<i>Equisetum arvense</i>	大藪町、開出今町、金亀町、野瀬町、古沢町、松原町、彦根城					
	トクサ		<i>Equisetum hymale</i>	荘厳寺町					逸出
ハナヤスリ	オオハナワラビ		<i>Botrychium japonicum</i>	下稲葉町、鳥居本町、服部町、仏生寺町、宮田町、愛知川、荒神山、佐和山					
	コヒロハハナヤスリ		<i>Ophioglossum petiolatum</i>					C	
	ナツノハナワラビ		<i>Botrychium virginianum</i>	荘厳寺町					
	ハマハナヤスリ		<i>Ophioglossum thermale var. nipponicum</i>		C	IV	D		
	フユノハナワラビ		<i>Botrychium ternatum</i>	金亀町、中山町、雨壺山、佐和山、彦根城					
ゼンマイ	ゼンマイ		<i>Osmunda japonica</i>	笹尾町、日夏町、荒神山、佐和山					
	ヤマドリゼンマイ		<i>Osmunda cinnamomea var. fokiensis</i>					D	
キジノオシダ	オオキジノオ		<i>Plagiogyria euphlebia</i>	男鬼町、金亀町、荘厳寺町、日夏町、荒神山、佐和山、彦根城					
	キジノオシダ		<i>Plagiogyria japonica</i>	稲里町、荘厳寺町、古沢町					
	フタツキジノオ		<i>Plagiogyria × sessilifolia</i>	荘厳寺町					
	ヤマンテツ		<i>Plagiogyria matsumureana</i>	男鬼町					
ウラジロ	ウラジロ		<i>Gleichenia japonica</i>	小野町、日夏町、山之脇町、雨壺山、荒神山、佐和山					
	コシダ		<i>Dicranopteris linearis</i>	野田山町、日夏町、古沢町、荒神山					
フサシダ	カニクサ		<i>Lygodium japonicum</i>	小野町、金亀町、笹尾町、鳥居本町、古沢町、松原町、芹川、彦根城					
コケシノブ	ウチワゴケ		<i>Gonocormus minutus</i>	金亀町					
	コウヤコケシノブ		<i>Hymenophyllum barbatum</i>	笹尾町、仏生寺町					
コバノイシカグマ	イヌシダ		<i>Dennstaedtia hirsuta</i>	金亀町、善谷町、仏生寺町、彦根城					
	イワヒメワラビ		<i>Hypolepis punctata</i>	金亀町、笹尾町、古沢町、佐和山、彦根城					
	ケバカフモトシダ		<i>Microlepia marginata var. bipinnata f. yakusimensis</i>	小野町、金亀町、善谷町、古沢町、佐和山、彦根城					
	コバノイシカグマ		<i>Dennstaedtia scabra</i>	笹尾町、佐和山町、鳥居本町、仏生寺町、雨壺山、荒神山					
	フモトシダ		<i>Microlepia marginata</i>	小野町、金亀町、中山町、日夏町、古沢町、荒神山、佐和山、彦根城					
	ワラビ		<i>Pteridium aquilinum var. latiusculum</i>	大塚町、笹尾町、鳥居本町、古沢町、雨壺山					
ホングウシダ	ホラシノブ		<i>Sphenomeris chinensis</i>	男鬼町、笹尾町、佐和山町、荘厳寺町、鳥居本町、日夏町、古沢町、宮田町、山之脇町、雨壺山、荒神山、芹川					
ミズワラビ	イヌイワガネソウ		<i>Coniogramme × fauriei</i>	日夏町、荒神山					
	イワガネゼンマイ		<i>Coniogramme intermedia</i>	古沢町、宮田町					
	イワガネソウ		<i>Coniogramme japonica</i>	金亀町、古沢町、本庄町、愛知川、佐和山、彦根城					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ミズワラビ	クジャクシダ		<i>Adiantum pedatum</i>	男鬼町					
	タチシノブ		<i>Onychium japonicum</i>	男鬼町、善谷町、古沢町、佐和山					
	ミズワラビ		<i>Ceratopteris thalictroides</i>	石寺町、稲枝町、大藪町、大藪町、小野町、開出今町、金沢町、甘呂町、清崎町、笹尾町、薩摩町、佐和山町、荘厳寺町、新海町、須越町、芹川町、鳥居本町、中山町、長曾根南町、中藪、野瀬町、野田山町、八坂町、肥田町、日夏町、古沢町、松原町、宮田町、安清東町、佐和山		準			
イノモトソウ	イノモトソウ		<i>Pteris multifida</i>	小野町、銀座町、金亀町、鳥居本町、日夏町、仏生寺町、古沢町、宮田町、荒神山、佐和山、彦根城					
	オオバノイノモトソウ		<i>Pteris cretica</i>	金亀町、荘厳寺町、仏生寺町、古沢町、荒神山、佐和山、彦根城					
	オオバノハチジョウシダ		<i>Pteris excelsa</i>	笹尾町、仏生寺町、佐和山					
	セフリイノモトソウ		<i>Pteris × sefricola</i>	小野町					
チャセンシダ	イヌチャセンシダ		<i>Asplenium tripteropus</i>	金亀町、彦根城					
	クモノスシダ		<i>Asplenium ruprechtii</i>	男鬼町					
	クルマシダ		<i>Asplenium wrightii</i>					B	
	コタニワタリ		<i>Asplenium scolopendrium</i>	男鬼町、荘厳寺町、仏生寺町					
	コバノキノキシダ		<i>Asplenium sarelii</i>	男鬼町、金亀町、仏生寺町、武奈町、彦根城					
	チャセンシダ		<i>Asplenium trichomanes</i>	金亀町、彦根城					
	トラノオシダ		<i>Asplenium incisum</i>	大堀町、銀座町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、仏生寺町、古沢町、松原町、宮田町、雨壺山、彦根城					
	ヌリトラノオ		<i>Asplenium normale</i>	金亀町、彦根城					
シシガシラ	シシガシラ		<i>Struthiopteris niponica</i>	大堀町、笹尾町、原町、日夏町、宮田町、雨壺山、荒神山、佐和山					
オシダ	アイアスカイノデ		<i>Polystichum longifrons</i>	稲里町、金亀町、佐和山町、荘厳寺町、日夏町、武奈町、松原町、宮田町、荒神山、佐和山、彦根城					
	アイノクマワラビ		<i>Dryopteris × mituii</i>	大堀町、開出今町、金亀町、笹尾町、鳥居本町、宮田町、雨壺山、彦根城					
	アオハリガネワラビ		<i>Thelypteris japonica var. formosa f. viridescens</i>	荘厳寺町、日夏町、荒神山					
	イヌイワヘゴ		<i>Dryopteris atrata f. cycadina</i>	鳥居本町、武奈町					
	イノデ		<i>Polystichum polyblepharum</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町、中山町、日夏町、仏生寺町、武奈町、古沢町、本庄町、宮田町、山之脇町、愛知川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	イノデモドキ		<i>Polystichum tagawanum</i>	男鬼町、笹尾町、武奈町、宮田町					
	イワヘゴ		<i>Dryopteris atrata</i>	男鬼町、宮田町、佐和山					
	オオイタチシダ		<i>Dryopteris varia var. hikonensis</i>	大堀町、金亀町、鳥居本町、仏生寺町、古沢町、宮田町、佐和山、彦根城					
	オオカナワラビ		<i>Arachniodes amabilis</i>	稲里町、荘厳寺町、鳥居本町、宮田町、佐和山					
	オオキヨズミシダ		<i>Polystichum tsus-simense var. mayebarai</i>	善谷町、仏生寺町					
	オオクジャクシダ		<i>Dryopteris dickinsii</i>	男鬼町、武奈町、宮田町、佐和山					
	オオベニシダ		<i>Dryopteris hondoensis</i>	甲田町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、野田山町、仏生寺町、古沢町、宮田町、雨壺山、荒神山、彦根城					
	オクマワラビ		<i>Dryopteris uniformis</i>	小野町、金亀町、笹尾町、佐和山町、荘厳寺町、鳥居本町、仏生寺町、古沢町、宮田町、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	オシダ		<i>Dryopteris crassirhizoma</i>	宮田町、佐和山					
	オニカナワラビ		<i>Arachniodes simplicior var. major</i>	金亀町、笹尾町、佐和山町、仏生寺町、佐和山、彦根城					
	カタイノデ		<i>Polystichum makinoi</i>				Ⅲ	D	
	キノクニベニシダ		<i>Dryopteris kinokuniensis</i>	金亀町、武奈町、古沢町、彦根城					
ギフベニシダ		<i>Dryopteris kinkiensis</i>						D	

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
オシダ	キヨスミメワラビ		<i>Ctenitis maximowicziana</i>	笹尾町、武奈町					
	クマワラビ		<i>Dryopteris lacera</i>	金亀町、原町、仏生寺町、宮田町、雨壺山、佐和山、彦根城					
	サイゴクイノデ		<i>Polystichum pseudo-makinoi</i>	笹尾町、武奈町					
	サイゴクベニシダ		<i>Dryopteris championii</i>	大塚町、金亀町、荘厳寺町、日夏町、武奈町、古沢町、宮田町、荒神山、彦根城					
	サカゲイノデ		<i>Polystichum retroso-paleaceum</i>	男鬼町、下稲葉町、武奈町、古沢町、宮田町、愛知川、佐和山					
	サカゲカタイノデ		<i>Polystichum × microlepis</i>	武奈町					
	シノブカグマ		<i>Arachniodes mutica</i>	宮田町、佐和山					
	ジュウモンジシダ		<i>Polystichum tripterum</i>	男鬼町、佐和山町、仏生寺町、古沢町、佐和山					
	ツヤナシイノデ		<i>Polystichum ovato-paleaceum</i>	男鬼町、佐和山町、佐和山					
	ツルデンダ		<i>Polystichum craspedosorum</i>	男鬼町					
	テリハヤブソテツ		<i>Cyrtomium fortunei f. laetivirens</i>	甲田町、金亀町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町、野田山町、仏生寺町、古沢町、宮田町、佐和山、彦根城					
	トウゴクシダ		<i>Dryopteris erythrosora var. dilatata</i>	男鬼町、甲田町、金亀町、佐和山町、善谷町、鳥居本町、野田山町、日夏町、仏生寺町、武奈町、古沢町、宮田町、山之脇町、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	ドウリウウイノデ		<i>Polystichum × anceps</i>	金亀町、本庄町、愛知川、彦根城					
	ナガバヤブソテツ		<i>Cyrtomium devexiscapulas</i>	金亀町、荘厳寺町、野田山町、松原町、佐和山、彦根城					
	ナンゴクナライシダ		<i>Leptorumohra miqueliana var. narawensis</i>	男鬼町、仏生寺町、武奈町					
	ノギリヤマヤブソテツ		<i>Cyrtomium fortunei var. clivicola f. grossidens</i>	荘厳寺町					帰化
	ハカタシダ		<i>Arachniodes simplicior</i>	金亀町、宮田町、彦根城					
	ヒメカナワラビ		<i>Polystichum tsus-simense</i>	男鬼町、荘厳寺町					
	ヒロハヤブソテツ		<i>Cyrtomium macrophyllum</i>				III	D	
	フナコシイノデ		<i>Polystichum × inadae</i>	笹尾町、宮田町、佐和山					
	ベニシダ		<i>Dryopteris erythrosora</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町、野田山町、仏生寺町、武奈町、古沢町、三津屋町、宮田町、山之脇町、雨壺山、荒神山、佐和山、曾根沼、彦根城					
	ホクリクイノデ		<i>Polystichum × hokurikuense</i>	宮田町、佐和山					
	ミゾシダ		<i>Stegnogramma pozei ssp. mollissima</i>	八坂町、犬上川					
ミヤコヤブソテツ		<i>Cyrtomium fortunei var. intermedium</i>	男鬼町、荘厳寺町、野田山町、仏生寺町						
ヤブソテツ		<i>Cyrtomium fortunei</i>	稲里町、大塚町、男鬼町、清崎町、金亀町、笹尾町、古沢町、本庄町、松原町、宮田町、愛知川、矢倉川、雨壺山、佐和山、彦根城						
ヤマイトチシダ		<i>Dryopteris varia var. setosa</i>	大塚町、笹尾町、荘厳寺町、仏生寺町、武奈町、古沢町、宮田町、雨壺山、荒神山						
ヤマヤブソテツ		<i>Cyrtomium fortunei var. clivicola</i>	男鬼町、開出今町、銀座町、金亀町、佐和山町、鳥居本町、野田山町、仏生寺町、武奈町、古沢町、本庄町、宮田町、山之脇町、愛知川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城						
ヤワラシダ		<i>Thelypteris laxa</i>	笹尾町、善谷町、原町、日夏町、仏生寺町、荒神山						
リョウメンシダ		<i>Arachniodes standishii</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、武奈町、古沢町、荒神山、佐和山、彦根城						
ヒメシダ	ゲジゲジシダ		<i>Phegopteris decursive-pinnata</i>	金亀町、善谷町、佐和山、彦根城					
	コハシゴシダ		<i>Thelypteris glanduligera var. elatior</i>	稲里町、小野町、笹尾町、荘厳寺町、雨壺山					
	ハシゴシダ		<i>Thelypteris glanduligera</i>	甲田町、鳥居本町、宮田町、雨壺山					
	ハリガネワラビ		<i>Thelypteris japonica</i>	男鬼町、笹尾町					
	ヒメシダ		<i>Thelypteris palustris</i>	笹尾町、三津屋町、曾根沼					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ヒメシダ	ヒメワラビ		<i>Thelypteris torresiana</i> var. <i>calvata</i>	男鬼町、小野町					
	ホシダ		<i>Cyclogramma acuminatus</i>	小野町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、田附町、鳥居本町、野瀬町、日夏町、仏生寺町、古沢町、和田町、愛知川、荒神山、佐和山、彦根城					
	ミゾシダ		<i>Stegnogramma pozoi</i> subsp. <i>mollissima</i>	男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、八坂町、原町、犬上川、佐和山					
	ミドリヒメワラビ		<i>Thelypteris viridifrons</i>	小野町、金亀町、宮田町、彦根城					
メシダ	イヌワラビ		<i>Athyrium niponicum</i>	男鬼町、銀座町、甲田町、金亀町、荘厳寺町、鳥居本町、仏生寺町、彦根城					
	ウラボシノコギリシダ		<i>Athyrium sheareri</i>					D	
	オオサトメシダ		<i>Athyrium</i> × <i>multifidum</i>	武奈町、宮田町					
	オオヒメワラビ		<i>Deparia okuboana</i>	男鬼町、八坂町、武奈町、本庄町、犬上川、愛知川					
	オニヒカゲワラビ		<i>Diplazium nipponicum</i>	笹尾町					
	カラクサイヌワラビ		<i>Athyrium clivicola</i>	男鬼町、笹尾町、野田山町、仏生寺町					
	キヨタキシダ		<i>Diplazium squamigerum</i>	下稲葉町、愛知川					
	クサソテツ		<i>Matteuccia struthiopteris</i>	大堀町、金亀町、八坂町、古沢町、本庄町、犬上川、芹川、彦根城					
	コウヤワラビ		<i>Onoclea sensibilis</i> var. <i>interrupta</i>					E	
	サキモリイヌワラビ		<i>Athyrium oblitescens</i>	稲里町、笹尾町、佐和山町、日夏町、仏生寺町、宮田町、荒神山					
	サトメシダ		<i>Athyrium deltoidifrons</i>	笹尾町、佐和山町、鳥居本町					
	シケシダ		<i>Deparia japonica</i>	稲里町、笹尾町、佐和山町、下稲葉町、鳥居本町、野田山町、日夏町、古沢町、本庄町、宮田町、愛知川、荒神山					
	シケチシダ		<i>Cornopteris decurrenti-alata</i>	稲里町、甲田町、金亀町、笹尾町、善谷町、鳥居本町、仏生寺町、古沢町、彦根城					
	セイタカシケシダ		<i>Deparia dimorphophylla</i>					D	
	タニヌワラビ		<i>Athyrium otophorum</i>	笹尾町、荘厳寺町、野田山町、日夏町、武奈町、荒神山					
	タンゴワラビ		<i>Diplazium</i> × <i>sacrosanctum</i>	小野町、笹尾町、荘厳寺町、古沢町					
	トガリバイヌワラビ		<i>Athyrium iseanum</i> f. <i>angustisectum</i>	宮田町					
	ヌリワラビ		<i>Athyrium mesosorum</i>	男鬼町					
	ノコギリシダ		<i>Diplazium wichurae</i>	鳥居本町、仏生寺町					
	ハクモウイノデ		<i>Deparia pycnosora</i>	男鬼町					
	ヒカゲワラビ		<i>Diplazium chinense</i>	男鬼町、金亀町、善谷町、鳥居本町、仏生寺町、宮田町、彦根城					
	ヒロハインワラビ		<i>Athyrium wardii</i>	男鬼町、甲田町、金亀町、佐和山町、原町、仏生寺町、宮田町、彦根城					
	ヘビノネゴザ		<i>Athyrium yokoscense</i>	男鬼町					
ホクリクイヌワラビ		<i>Athyrium</i> × <i>saitoanum</i>	金亀町、彦根城						
ホソバイヌワラビ		<i>Athyrium iseanum</i>	甲田町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、日夏町、仏生寺町、宮田町、荒神山						
ヤマインワラビ		<i>Athyrium vidalii</i>	男鬼町、下稲葉町、日夏町、仏生寺町、宮田町、荒神山、愛知川						
ウラボシ	クリハラン		<i>Neocheropteris ensata</i>	荘厳寺町、仏生寺町					
	ナガオノキシノブ		<i>Lepisorus thunbergianus</i> var. <i>angustus</i>	金亀町、彦根城					
	ノキシノブ		<i>Lepisorus thunbergianus</i>	稲里町、金亀町、古沢町、彦根城					
	ヒトツバ		<i>Pyrrosia lingua</i>	金亀町、日夏町、荒神山、彦根城					
	ヒメサジラン		<i>Loxogramme graminoides</i>				Ⅲ	B	
	マメヅタ		<i>Lemmaphyllum microphyllum</i>	金亀町、笹尾町、仏生寺町、彦根城					
アカウキクサ	オオアカウキクサ		<i>Azolla japonica</i>	新海町、長曾根町、八坂町、船町、松原町、犬上川、旧彦根港、湖岸、芹川	VU	準	Ⅵ		

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
イチヨウ	イチヨウ		Ginkgo biloba	金亀町、彦根城					
マツ	アカマツ		Pinus densiflora	大堀町、金亀町、笹尾町、彦根城					
	クロマツ		Pinus thunbergii	金亀町、彦根城					植栽
	ツガ		Tsuga sieboldii	金亀町、彦根城					植栽
	モミ		Abies firma	小野町、金亀町、彦根城					植栽
スギ	スギ		Cryptomeria japonica	金亀町、笹尾町、本庄町、彦根城					
	メタセコイア		Metasequoia glyptostroboides	尾末町					植栽
	ラクウショウ		Taxodium distichum	野瀬町、三津屋町、曾根沼					植栽
ヒノキ	イブキ		Juniperus chinensis	金亀町、彦根城					植栽
	スイリュウヒバ		Chamaecyparis obtusa f. pendula	金亀町、彦根城					植栽
	チャボヒバ		Chamaecyparis obtusa var. brevifolia	金亀町、彦根城					植栽
	ネズ	ネズミサン	Juniperus rigida	金亀町、佐和山					
	ヒノキ		Chamaecyparis obtusa	大堀町、金亀町、笹尾町、平田町、本庄町、彦根城					植栽
	ヒヨクヒバ		Chamaecyparis pisifera var. filifera	金亀町、彦根城					植栽
マキ	イヌマキ		Podocarpus macrophyllus	金亀町、正法寺町、彦根城					
	ナギ		Podocarpus nagi	金亀町、彦根城					植栽
	ラカンマキ		Podocarpus macrophyllus var. maki	金亀町、彦根城					植栽
イヌガヤ	ハイヌガヤ		Cephalotaxus harringtonia var. nana	仏生寺町、武奈町					
イチイ	チャボガヤ		Torreya nucifera var. radicans	男鬼町					
ヤマモモ	ヤマモモ		Myrica rubra	金亀町、古沢町、彦根城					植栽？
クルミ	オニグルミ		Juglans ailanthifolia	池州町、大藪町、後三条町、長曾根町、八坂町、馬場、本庄町、犬上川、愛知川、芹川、平田川、湖岸					
	サワグルミ		Pterocarya rhoifolia	男鬼町、武奈町					
	シナサワグルミ		Pterocarya stenoptera	笹尾町、三津屋町、曾根沼					植栽
ヤナギ	アカメヤナギ	マルバヤナギ	Salix chaenomeloides	大藪町、笹尾町、薩摩町、新海町、八坂町、松原町、三津屋町、柳川町、犬上川、平田川、曾根沼、野田沼、湖岸					
	イヌコリヤナギ		Salix integra	大堀町、八坂町、犬上川、芹川					
	ウンリュウヤナギ		Salix matsudana	大堀町、芹川					逸出
	オオタチヤナギ		Salix pierotii	大藪町、新海町、須越町、八坂町、本庄町、三津屋町、犬上川、愛知川、曾根沼、野田沼、湖岸					
	オノエヤナギ		Salix sachalinensis	八坂町、日夏町、犬上川					
	カワヤナギ		Salix gilgiana	新海町、長曾根町、八坂町、本庄町、三津屋町、犬上川、愛知川、湖岸					
	キヌヤナギ		Salix kinuyanagi	松原町					帰化？
	コゴメヤナギ		Salix serissaefolia	金亀町、八坂町、犬上川、野田沼、彦根城					
	コリヤナギ		Salix koriyanagi	須越町、野田沼					
	サイコクキツネヤナギ		Salix alopochroa	笹尾町					
	シダレヤナギ		Salix babylonica	須越町、長曾根町、湖岸、野田沼					植栽・帰化
	ジャヤナギ		Salix eriocarpa	新海町、八坂町、日夏町、三津屋町、犬上川、曾根沼、野田沼、湖岸					
	タチヤナギ		Salix subfragilis	金亀町、笹尾町、須越町、田附町、八坂町、松原町、三津屋町、犬上川、平田川、曾根沼、野田沼					
	ネコヤナギ		Salix gracilistyla	笹尾町、長曾根町、本庄町、愛知川、平田川、湖岸					
	ヤマナラシ		Populus sieboldii	大堀町、新海町					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
カバノキ	アカシデ		<i>Carpinus laxiflora</i>	男鬼町、荘厳寺町、八坂町、原町					
	イヌシデ		<i>Carpinus tschonoskii</i>	大堀町、男鬼町、笹尾町、正法寺町、八坂町、原町、芹川					
	オオバヤシャブシ		<i>Alnus sieboldiana</i>	男鬼町、八坂町、仏生寺町、荒神山					
	クマシデ		<i>Carpinus japonica</i>	男鬼町、田附町、愛知川					
	ケヤマハンノキ		<i>Alnus hirsuta</i>	八坂町、荒神山					
	ツノハシバミ		<i>Corylus sieboldiana</i>	男鬼町					
	ハンノキ		<i>Alnus japonica</i>	笹尾町、八坂町、日夏町、三津屋町、荒神山、曾根沼					
	ヒメヤシャブシ		<i>Alnus pendula</i>	男鬼町、野田山町、八坂町、仏生寺町					
ブナ	アカガシ		<i>Quercus acuta</i>	柳川町					
	アベマキ		<i>Quercus variabilis</i>	大堀町、笹尾町、正法寺町、松原町、矢倉川、雨壺山					
	アラカン		<i>Quercus glauca</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、正法寺町、仏生寺町、本庄町、愛知川、雨壺山、彦根城					
	ウバメガシ		<i>Quercus phillyraeoides</i>	金亀町、彦根城					植栽
	オオツクバネガシ		<i>Quercus × takaoyamensis</i>	金亀町、彦根城					
	クスギ		<i>Quercus acutissima</i>	金亀町、八坂町、雨壺山、彦根城					
	クリ		<i>Castanea crenata</i>	男鬼町、笹尾町					
	コジイ	ツブラジイ	<i>Castanopsis cuspidata</i>	金亀町、古沢町、彦根城					
	コナラ		<i>Quercus serrata</i>	大堀町、男鬼町、金亀町、笹尾町、正法寺町、仏生寺町、雨壺山、荒神山、彦根城					
	シラカン		<i>Quercus myrsinaefolia</i>	男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、城町、仏生寺町、古沢町、柳川町、犬上川、雨壺山、荒神山、湖岸					
	スダジイ		<i>Castanopsis cuspidata var. sieboldii</i>	金亀町、古沢町、三津屋町、曾根沼、彦根城					
	ツクバネガシ		<i>Quercus sessilifolia</i>	金亀町、笹尾町、彦根城					
	ナラガシワ		<i>Quercus aliena</i>	尾末町、金亀町、鳥居本町、田附町、野田山町、肥田町、三津屋町、犬上川、愛知川、芹川、曾根沼、彦根城					
	マテバシイ		<i>Lithocarpus edulis</i>	八坂町、本庄町					植栽
ミズナラ		<i>Quercus mongolica ssp. crispula</i>	男鬼町、正法寺町						
ニレ	アキニレ		<i>Ulmus parvifolia</i>	大堀町、大藪町、後三条町、金亀町、正法寺町、芹町、八坂町、松原町、三津屋町、安清町、犬上川、芹川、曾根沼、彦根城					
	エノキ		<i>Celtis sinensis var. japonica</i>	金亀町、笹尾町、長曾根町、中藪町、犬上川、芹川、雨壺山、彦根城					
	オヒヨウ		<i>Ulmus laciniata</i>	男鬼町					
	ケヤキ		<i>Zelkova serrata</i>	大堀町、男鬼町、金亀町、正法寺町、中藪町、柳川町、芹川、雨壺山、彦根城、湖岸					
	ハルニレ		<i>Ulmus japonica</i>	八坂町		C	IV		植栽
	ムクノキ		<i>Aphananthe aspera</i>	池州町、宇尾町、大堀町、後三条町、金亀町、正法寺町、鳥居本町、長曾根町、野瀬町、本庄町、犬上川、芹川、愛知川、雨壺山、彦根城					
クワ	オオイタビ		<i>Ficus pumila</i>					D	
	カジノキ		<i>Broussonetia papyrifera</i>	大堀町、開出今町、金亀町、芹川町、芹橋、芹町、東沼波町、古沢町、犬上川、芹川、雨壺山、彦根城					
	カナムグラ		<i>Humulus japonicus</i>	大堀町、後三条町、金亀町、八坂町、古沢町、松原町、富田町、安清町、犬上川、芹川、佐和山、彦根城					史前帰化
	マグワ		<i>Morus alba</i>	犬上川					帰化
	クワクサ		<i>Fatoua villosa</i>	大藪町、男鬼町、小野町、清崎町、金亀町、笹尾町、古沢町、本庄町、松原町、犬上川、芹川、平田川、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ヒメイタビ		<i>Ficus thunbergii</i>	金亀町、彦根城					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
クワ	ヒメコウゾ		<i>Broussonetia kazinoki</i>	善谷町、鳥居本町、雨壺山、佐和山					
	ヤマグワ		<i>Morus australis</i>	大堀町、男鬼町、金亀町、笹尾町、薩摩町、新海町、武奈町、古沢町、松原町、犬上川、荒神山、彦根城					
イラクサ	アオミズ		<i>Pilea pumila</i>	男鬼町、金亀町、下稲葉町、立花町、鳥居本町、日夏町、和田町、愛知川、雨壺山、荒神山、彦根城					
	アカソ		<i>Boehmeria sylvestris</i>	男鬼町、善谷町、仏生寺町、佐和山					
	イラクサ		<i>Urtica thunbergiana</i>	大堀町、開出今町、野瀬町、本庄町、犬上川、愛知川、芹川					
	ウワバミソウ	ミズナ	<i>Elatostema umbellatum var. majus</i>	男鬼町、本庄町、安清東町、愛知川					
	カタバヤブマオ	マルバヤブマオ	<i>Boehmeria dura</i>	男鬼町、小野町、金亀町、笹尾町、新海町、鳥居本町、馬場、仏生寺町、平田川、彦根城					
	カテンソウ		<i>Nanocnide japonica</i>	荘厳寺町、八坂町、武奈町、本庄町、犬上川					
	カラムシ	クサマオ	<i>Boehmeria nipononivea</i>	男鬼町、金亀町、下稲葉町、善谷町、野瀬町、八坂町、仏生寺町、本庄町、宮田町、愛知川、平田川、彦根城					
	クサマオ		<i>Boehmeria nivea ssp. nipononivea</i>	鳥居本町					
	コアカソ		<i>Boehmeria spicata</i>	笹尾町、佐和山町、善谷町、鳥居本町、本庄町、宮田町、愛知川					
	コミヤマミズ		<i>Pilea notata</i>	鳥居本町、野田山町、芹川					
	サンショウソウ		<i>Pellionia minima</i>	野田山町					
	ナガバヤブマオ		<i>Boehmeria sieboldiana</i>	八坂町、本庄町、犬上川、愛知川					
	ナンバンカラムシ	マオ	<i>Boehmeria nivea</i>	河原、荘厳寺町、善谷町、芹川、平田川					帰化
	ミズ		<i>Pilea hamaoi</i>	金亀町、佐和山、彦根城					
	ミヤマイラクサ		<i>Laportea macrostachya</i>	男鬼町					
	ムカゴイラクサ		<i>Laportea bulbifera</i>	鳥居本町、武奈町、本庄町					
	メヤブマオ		<i>Boehmeria platanifolia</i>	清崎町、金亀町、下稲葉町、田附町、八坂町、本庄町、和田町、犬上川、愛知川、平田川、雨壺山、荒神山、彦根城					
	ヤブマオ		<i>Boehmeria japonica var. longispica</i>	金亀町、宮田町、柳川町、芹川、荒神山					
	ヤマトキホコリ		<i>Elatostema laetevirens</i>	男鬼町					
	ヤマミズ		<i>Pilea japonica</i>	男鬼町					
ビャクダン	カナビキノウ		<i>Thesium chinense</i>	男鬼町、広野町、薩摩町、三津屋町、犬上川					
ヤドリギ	ヤドリギ		<i>Viscum album ssp. coloratum</i>	金亀町、彦根城					
タデ	アキノウナギツカミ		<i>Persicaria sieboldii</i>	笹尾町、荘厳寺町、日夏町、松原町、荒神山、佐和山					史前帰化
	アレチギシギシ		<i>Rumex conglomeratus</i>	大堀町、大藪町、尾末町、河原、金亀町、清崎町、新海町、八坂町、東沼波町、松原町、三津屋町、安清東町、犬上川、芹川、曾根沼、彦根城					帰化
	イシミカワ		<i>Persicaria perfoliata</i>	金亀町、薩摩町、新海町、三津屋町、曾根沼、彦根城					史前帰化
	イタドリ		<i>Reynoutria japonica</i>	開出今町、河原、金亀町、笹尾町、田附町、長曾根町、八坂町、日夏町、仏生寺町、古沢町、松原町、犬上川、芹川、平田川、雨壺山、佐和山、彦根城、湖岸					
	イヌタデ		<i>Persicaria longiseta</i>	大藪町、小野町、開出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、薩摩町、荘厳寺町、芹中町、立花町、田附町、鳥居本町、長曾根町、野瀬町、日夏町、平田町、普光寺町、古沢町、本庄町、本町、松原町、三津屋町、芹川、雨壺山、荒神山、佐和山、曾根沼、彦根城					史前帰化
	エゾノギシギシ		<i>Rumex obtusifolius</i>	大堀町、尾末町、河原、清崎町、金亀町、笹尾町、新海町、鳥居本町、東沼波町、日夏町、古沢町、芹川、彦根城					帰化
	オオイヌタデ		<i>Persicaria lapathifolia</i>	石寺町、大藪町、開出今町、清崎町、薩摩町、新海町、芹橋、長曾根町、西今町、八坂町、馬場、武奈町、松原町、南三ツ谷町、和田町、犬上川、芹川、雨壺山、湖岸					史前帰化

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
タデ	オオケタデ		<i>Persicaria orientalis</i>	普光寺町、堀町、松原町、雨壺山					帰化
	オオハルタデ		<i>Persicaria vulgaris var. pubescens</i>	銀座町、新海町、田附町、愛知川					
	オオミゾソバ		<i>Persicaria thunbergii var. hastatotriloba</i>	大藪町、笹尾町					
	ギシギシ		<i>Rumex japonicus</i>	大堀町、尾末町、開出今町、金亀町、佐和山町、新海町、長曾根南町、野瀬町、東沼波町、日夏町、三津屋町、芹川、平田川、曾根沼、彦根城					
	ギンミズヒキ		<i>Antenoron filiforme f. albiflora</i>	善谷町、本庄町、雨壺山、佐和山					
	サクラタデ		<i>Persicaria conspicua</i>	大藪町、小野町、笹尾町、薩摩町、新海町、八坂町、松原町、三津屋町、犬上川、曾根沼					
	サデクサ		<i>Persicaria maackiana</i>			C		C	
	サナエタデ		<i>Persicaria scabra</i>	薩摩町、新海町、芹川町、八坂町、松原町、犬上川					
	シャクチリソバ	ヒマラヤソバ	<i>Fagopyrum cymosum</i>	清崎町、金亀町、野田山町、八坂町、東沼波町、古沢町、松原町、犬上川、芹川、雨壺山、荒神山、彦根城					帰化
	シロバナサクラタデ		<i>Persicaria japonica</i>	大藪町、清崎町、笹尾町、佐和山町、芹川町、外町、馬場、平田町、松原町、三津屋町、安清町、芹川、平田川、曾根沼					
	シンミズヒキ		<i>Antenoron neo-filiforme</i>	下稲葉町、古沢町、犬上川、愛知川、佐和山					
	スイバ		<i>Rumex acetosa</i>	清崎町、笹尾町、八坂町、松原町、三津屋町、芹川、佐和山、曾根沼					
	ソバ		<i>Fagopyrum sagittatum</i>	金亀町、新海町					逸出
	ツルソバ		<i>Persicaria chinense</i>	清崎町		A			帰化
	ツルドクダミ		<i>Pleuropterus multiflorus</i>	安清町、芹川					帰化
	ナガバギシギシ		<i>Rumex crispus</i>	大堀町、大藪町、新海町、鳥居本町、野瀬町、日夏町、古沢町、松原町、芹川					帰化
	ナガバノウナギツカミ		<i>Persicaria hastato-sagittata</i>			C	III	C	
	ナガボハナタデ		<i>Persicaria yokusaiana f. laxiflora</i>	雨壺山					
	ハイミチヤナギ		<i>Polygonum arenastrum</i>	新海町、鳥居本町、古沢町					帰化
	ハナタデ		<i>Persicaria posumbu var. laxiflora</i>	男鬼町、金亀町、荘厳寺町、鳥居本町、中山町、野瀬町、日夏町、武奈町、古沢町、宮田町、山之脇町、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	ヒメスイバ		<i>Rumex acetosella</i>	薩摩町、新海町、鳥居本町、長曾根南町、三津屋町、曾根沼					帰化
	ベニタドリ		<i>Reynourtia japonica var. elata</i>	田附町					
	ホソバノウナギツカミ		<i>Persicaria praetermissa</i>	薩摩町、新海町、田附町、三津屋町、曾根沼、湖岸					
	ポントクタデ		<i>Persicaria pubescens</i>	仏生寺町、古沢町、本庄町					史前帰化
	マダイオウ		<i>Rumex madaio</i>			A	II	C	
	マダイオウとギシギシの雑種			東沼波町、芹川					
	ママコノシリヌグイ		<i>Persicaria senticosa</i>	男鬼町、笹尾町、長曾根町、八坂町、馬場、松原町、犬上川、芹川、雨壺山、湖岸					
ミズヒキ		<i>Antenoron filiforme</i>	男鬼町、清崎町、金亀町、笹尾町、新町、善谷町、仏生寺町、古沢町、山之脇町、和田町、雨壺山、彦根城						
ミゾソバ		<i>Persicaria thunbergii</i>	男鬼町、小野町、開出今町、金亀町、笹尾町、薩摩町、新町、戸賀町、鳥居本町、中山町、野瀬町、日夏町、古沢町、松原町、宮田町、和田町、雨壺山、佐和山、彦根城						
ミチヤナギ		<i>Polygonum aviculare</i>	開出今町、清崎町、金亀町、立花町、馬場、日夏町、松原町、犬上川、芹川、平田川、野田沼、彦根城					史前帰化	
ヤナギタデ		<i>Persicaria hydropiper</i>	大藪町、小野町、開出今町、金亀町、笹尾町、薩摩町、佐和山町、須越町、鳥居本町、中山町、野瀬町、八坂町、日夏町、松原町、三津屋町、宮田町、犬上川、曾根沼、野田沼、彦根城						
ヤノネグサ		<i>Persicaria nipponensis</i>	小野町、笹尾町、荘厳寺町、中山町、八坂町、三津屋町、宮田町、佐和山、曾根沼						

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ヤマゴボウ	マルミノヤマゴボウ		Phytolacca japonica	男鬼町					
	ヤマゴボウ		Phytolacca esculenta	新海町、仏生寺町					帰化
	ヨウシュヤマゴボウ	アメリカヤマゴボウ	Phytolacca americana	男鬼町、金亀町、薩摩町、新海町、新町、長曾根町、野瀬町、日夏町、古沢町、宮田町、和田町、犬上川、芹川、荒神山、彦根城					帰化
オシロイバナ	オシロイバナ		Mirabilis jalapa	馬場、古沢町					帰化
ザクロソウ	クルマバザクロソウ		Mollugo verticillata	新海町、田附町、三津屋町、曾根沼					帰化
	ザクロソウ		Mollugo pentaphylla	尾末町、新海町、鳥居本町、本庄町、松原町、三津屋町、曾根沼、湖岸					史前帰化
ハマミズナ	ツルナ		Tetragonia tetragonoides	善谷町、八坂町					帰化
スベリヒユ	スベリヒユ		Portulaca oleracea	大藪町、清崎町、金亀町、八坂町、日夏町、松原町、野田沼					史前帰化
ナデシコ	ウシハコベ		Stellaria aquatica	大堀町、金亀町、笹尾町、鳥居本町、野瀬町、八坂町、古沢町、松原町、宮田町、山之脇町、犬上川、芹川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					史前帰化
	オランダミミナグサ		Cerastium glomeratum	男鬼町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、野瀬町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、三津屋町、佐和山、曾根沼、彦根城、湖岸					帰化
	カワラナデシコ		Dianthus superbus var. longicalycinus	笹尾町、薩摩町、新海町、仏生寺町					
	ガンビ		Diplomorpha sikokiana	野田山町					
	ケフシグロ		Silene firma f. pubescens	新海町					
	コハコベ		Stellaria media	男鬼町、開出今町、金亀町、笹尾町、戸賀町、鳥居本町、古沢町、松原町、宮田町、芹川、彦根城					帰化
	サボンソウ	シヤボンソウ	Saponaria officinalis	宇尾町、広野町、八坂町、犬上川					帰化
	サワハコベ	ツルハコベ	Stellaria diversiflora	男鬼町、荘厳寺町、仏生寺町					
	シロバナマンテマ		Silene gallica	新海町、松原町、湖岸					帰化
	セキチク		Dianthus sinensis	新海町、愛知川					帰化
	ツメクサ		Sagina japonica	金亀町、新海町、立花町、鳥居本町、野瀬町、八坂町、雨壺山、彦根城					
	ノミノツツリ		Arenaria serpyllifolia	大藪町、金亀町、芹川町、大東町、田附町、東沼波町、本庄町、芹川、彦根城					史前帰化
	ノミノフスマ		Stellaria alsine var. undulata	大堀町、清崎町、金亀町、笹尾町、下福葉町、中央町、鳥居本町、本庄町、松原町、宮田町、愛知川、芹川、荒神山、佐和山、彦根城、湖岸					
	フシグロ		Silene firma	石寺町、薩摩町					
	マンテマ		Silene gallica var. quinquevulnera	金亀町、薩摩町、新海町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、湖岸					帰化
	ミドリハコベ		Stellaria neglecta	荘厳寺町、鳥居本町、東沼波町					
	ミミナグサ		Cerastium holosteoides var. angustifolium	池州町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、原町、東沼波町、芹川					史前帰化
	ミヤマハコベ		Stellaria sessiliflora	男鬼町、本庄町、柳川町、愛知川					
	ムシトリナデシコ		Silene armeria	宇尾町、大堀町、新海町、須越町、八坂町、本庄町、犬上川、芹川、湖岸					帰化
	アカザ	アカザ		Chenopodium album var. centrurubrum	東沼波町、芹川				
アリタソウ			Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum	石寺町、開出今町、薩摩町、新海町、犬上川、湖岸					帰化
カワラアカザ		ホンバナハマアカザ	Chenopodium virgatum				II	C	
ケアリタソウ			Chenopodium ambrosioides	大藪町、金亀町、佐和町、長曾根南町、野瀬町、野田山町、八坂町、東沼波町、犬上川、芹川、平田川、雨壺山、彦根城					帰化
ゴウシュウアリタソウ			Chenopodium pumilio	新海町、須越町、湖岸					帰化
シロザ		シロアカザ	Chenopodium album	池州町、大藪町、男鬼町、清崎町、薩摩町、新海町、須越町、鳥居本町、長曾根町、長曾根南町、八坂町、古沢町、松原町、犬上川、芹川、平田川、湖岸					史前帰化

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ヒユ	アオゲイトウ		<i>Amaranthus retroflexus</i>	大藪町、松原町、三津屋町、曾根沼					帰化
	イヌビユ		<i>Amaranthus lividus</i>	小野町、金亀町、薩摩町、本町、松原町、彦根城					史前帰化
	ツルノゲイトウ		<i>Alternanthera sessilis</i>	大藪町、笹尾町、八坂町、古沢町、松原町、三津屋町、安清東町、曾根沼					帰化
	ノゲイトウ		<i>Celosia argentea</i>	芹橋、長曾根町、八坂町、馬場、犬上川、芹川					帰化
	ヒカゲイノコズチ		<i>Achyranthes bidentata var. japonica</i>	金亀町、鳥居本町、日夏町、古沢町、山之脇町、和田町、犬上川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	ヒナタイノコズチ		<i>Achyranthes bidentata var. tomentosa</i>	大藪町、男鬼町、清崎町、金亀町、笹尾町、新海町、長曾根町、古沢町、松原町、三津屋町、宮田町、佐和山、曾根沼、彦根城、湖岸					
	ホソアオゲイトウ		<i>Amaranthus patulus</i>	稲枝町、金田町、薩摩町、新海町、芹川町、長曾根町、馬場、日夏町、松原町、宮田町、湖岸					帰化
	ホナガイヌビユ		<i>Amaranthus viridis</i>	清崎町、笹尾町、新海町					帰化
	ヤナギイノコズチ		<i>Achyranthes longifolia</i>	金亀町、下稲葉町、田附町、肥田町、古沢町、本庄町、愛知川、佐和山、彦根城			VI		
モクレン	オガタモノキ		<i>Michelia compressa</i>	城町、八坂町					植栽
	コブシ		<i>Magnolia praecocissima</i>			C		D	
	タムシバ		<i>Magnolia salicifolia</i>	男鬼町、笹尾町、野田山町					
	ホオノキ		<i>Magnolia hypoleuca</i>	男鬼町、笹尾町、三津屋町、曾根沼					植栽を含む
	モクレン		<i>Magnolia liliflora</i>	金亀町、彦根城					植栽
マツバサ	サネカズラ	ピナンカズラ	<i>Kadsura japonica</i>	大堀町、金亀町、新町、古沢町、本庄町、和田町、犬上川、荒神山、佐和山、彦根城					
シキミ	シキミ		<i>Illicium anisatum</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、彦根城					
クスノキ	アブラチャン		<i>Parabenzoin praecox</i>	男鬼町、犬上川					
	カゴノキ		<i>Actinodaphne lancifolia</i>	野田山町					
	カナクギノキ		<i>Lindera erythrocarpa</i>	笹尾町					
	クスノキ		<i>Cinnamomum camphora</i>	金亀町、芹川町、松原町、元町、彦根城					
	クロモジ		<i>Lindera umbellata</i>	男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、野田山町、佐和山					
	ゲッケイジュ		<i>Laurus nobilis</i>	金亀町、彦根城					
	シロダモ		<i>Neolitsea sericea</i>	大堀町、金亀町、荘厳寺町、正法寺町、野瀬町、仏生寺町、武奈町、本庄町、犬上川、雨壺山、彦根城					
	タブノキ		<i>Machilus thunbergii</i>	大堀町、金亀町、正法寺町、野田山町、松原町、犬上川、雨壺山、彦根城					
	ダンコウバイ		<i>Lindera obtusiloba</i>	大堀町、男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、中山町、佐和山					
	ニッケイ		<i>Cinnamomum sieboldii</i>	金亀町、田附町、愛知川、彦根城		NT			
	ヤブニッケイ		<i>Cinnamomum japonicum</i>	宇尾町、大堀町、金亀町、野瀬町、和田町、犬上川、雨壺山、彦根城					
	ヤマコウバシ		<i>Lindera glauca</i>	金亀町、笹尾町、野田山町、仏生寺町、彦根城					
	フサザクラ	フサザクラ		<i>Euptelea polyandra</i>	男鬼町				
カツラ	カツラ		<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	三津屋町、曾根沼					植栽
キンポウゲ	アキカラマツ		<i>Thalictrum minus var. hypoleucum</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、彦根城					
	アズマイチゲ		<i>Anemone raddeana</i>			準	VI	C	
	イチリンソウ		<i>Anemone nikoensis</i>	大堀町、金亀町、荘厳寺町、鳥居本町、野田山町、本庄町、犬上川、愛知川、彦根城					
	イヌショウマ		<i>Cimicifuga japonica</i>	八坂町、仏生寺町、犬上川					
	ウマノアシガタ	キンポウゲ	<i>Ranunculus japonicus</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、中山町、仏生寺町、武奈町、古沢町、和田町、雨壺山、佐和山、彦根城					
	オダマキ		<i>Aquilegia flabellata</i>	金亀町、荒神山、彦根城					帰化
	カザグルマ		<i>Clematis patens</i>		VU	C	I	B	

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等	
キンポウゲ	キクザキイチゲ		Anemone pseudo-altaica					B		
	キツネノボタン		Ranunculus silerifolius	大藪町、小野町、金亀町、笹尾町、正法寺町、本町、松原町、宮田町、安清町、佐和山、彦根城						
	クサボタン		Clematis stans	男鬼町						
	クロタネソウ	ニゲラ	Nigella damascena	蓮台寺町					帰化	
	ケキツネノボタン		Ranunculus cantoniensis	金亀町、荘厳寺町、八坂町、本庄町、愛知川						
	コセリバオウレン		Coptis japonica var. major	笹尾町						
	サラシナショウマ		Cimicifuga simplex	男鬼町						
	シュウメイギク		Anemone hupehensis var. japonica	金亀町、武奈町、彦根城						
	センニンソウ		Clematis terniflora	大藪町、男鬼町、尾末町、金亀町、栄町、笹尾町、佐和山町、新海町、長曾根町、野瀬町、八坂町、武奈町、古沢町、松原町、三津屋町、犬上川、芹川、雨壺山、佐和山、曾根沼、彦根城、湖岸						
	タガラシ		Ranunculus sceleratus	大藪町、清崎町、後三条町、中央町、鳥居本町、宮田町						史前帰化
	トウゴクサバノオ		Dichocarpum trachyspermum				V	D		
	ニリンソウ		Anemone flaccida	男鬼町、開出今町、野田山町、武奈町						
	ハンショウヅル		Clematis japonica	男鬼町、三津屋町、曾根沼						
	ヒメウズ		Aquilegia adoxoides	男鬼町、清崎町、金亀町、荘厳寺町、善谷町、中藪、古沢町、佐和山、彦根城						
	フクジュソウ		Adonis ramosa		VU	C	V	D		
ボタンヅル		Clematis apiifolia	男鬼町、仏生寺町、武奈町							
メギ	キバナイカリソウ	ニッコウイカリソウ	Epimedium koreanum							
	ナンテン		Nandina domestica	大堀町、金亀町、彦根城						
	ヒイラギナンテン		Mahonia japonica	金亀町、荒神山、彦根城					帰化	
	ホソバヒイラギナンテン		Mahonia fortunei	金亀町、荘厳寺町、鳥居本町、彦根城					帰化	
	メギ		Berberis thunbergii	男鬼町						
アケビ	アケビ		Akebia quinata	宇尾町、開出今町、金亀町、笹尾町、新海町、八坂町、古沢町、松原町、犬上川、芹川、荒神山、彦根城、雨壺山						
	ミツバアケビ		Akebia trifoliata	金亀町、笹尾町、仏生寺町、松原町、雨壺山、彦根城						
ツツラフジ	アオツツラフジ		Cocculus orbiculatus	開出今町、金亀町、笹尾町、古沢町、和田町、犬上川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城						
	オオツツラフジ		Sinomenium acutum	男鬼町、金亀町						
スイレン	オニバス		Euryale ferox		VU	C	I	D		
	ハス		Nelumbo nucifera	金亀町、本町					植栽	
	ヒメコウホネ		Nuphar subintegerrimum		VU	C	IV	D		
マツモ	マツモ		Ceratophyllum demersum	薩摩町、柳川町						
ドクダミ	ドクダミ		Houttuynia cordata	大堀町、清崎町、金亀町、笹尾町、鳥居本町、古沢町、三津屋町、雨壺山、曾根沼、彦根城						
	ハンゲシヨウ		Saururus chinensis					D		
センリョウ	ヒトリシズカ		Chloranthus japonicus	武奈町						
	フタリシズカ		Chloranthus serratus	男鬼町						
ウマノスズクサ	ウマノスズクサ		Aristolochia debilis					D		
	ヒメカンアオイ		Heterotropa takaoui	新海町、田附町、愛知川						
	ミヤコアオイ		Heterotropa aspera	石寺町、男鬼町、笹尾町、佐和山町、善谷町、鳥居本町、野田山町、原町、仏生寺町、宮田町、犬上川、荒神山、佐和山						

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ボタン	ヤマシャクヤク		<i>Paeonia japonica</i>		VU	C	Ⅲ	D	
マタタビ	サルナシ	シラクチヅル	<i>Actinidia arguta</i>	男鬼町					
	マタタビ		<i>Actinidia polygama</i>	男鬼町					
ツバキ	サカキ		<i>Cleyera japonica</i>	清崎町、金亀町、笹尾町、彦根城					
	サザンカ		<i>Camellia sasanqua</i>	金亀町、彦根城					植栽
	チャノキ		<i>Thea sinensis</i>	大塚町、金亀町、笹尾町、正法寺町、鳥居本町、古沢町、本庄町、和田町、犬上川、彦根城					
	ハマヒサカキ		<i>Eurya emarginata</i>	尾末町					植栽
	ヒサカキ		<i>Eurya japonica</i>	大塚町、男鬼町、稲里町、金亀町、笹尾町、正法寺町、芹川、雨壺山、佐和山、彦根城					
	モッコク		<i>Ternstroemia gymnanthera</i>	大塚町、金亀町、正法寺町、彦根城					
	ヤブツバキ		<i>Camellia japonica</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、彦根城					
オトギリソウ	オトギリソウ		<i>Hypericum erectum</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町、古沢町、松原町、芹川、雨壺山、荒神山、佐和山					
	キンシバイ		<i>Norysca patula</i>	石寺町					
	コケオトギリ		<i>Hypericum laxum</i>	小野町、清崎町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町、普光寺町、荒神山、佐和山					
	コゴメバオトギリ		<i>Hypericum perforatum var. angustifolium</i>	新海町、元町					帰化
	サワオトギリ		<i>Hypericum pseudopetiolatum</i>	小野町、金亀町、笹尾町、仏生寺町、彦根城					
	ミズオトギリ		<i>Triadenum japonicum</i>	三津屋町、曾根沼					
ケシ	クサノオウ		<i>Chelidonium majus var. asiaticum</i>	男鬼町、尾末町、金亀町、新海町、中藪、彦根城、湖岸					
	ジロボウエンゴサク		<i>Corydalis decumbens</i>				Ⅳ	B	
	タケニグサ	チヤンバギク	<i>Macleaya cordata</i>	大藪町、広野町、須越町、松原町、宮田町、犬上川					
	ナガミヒナゲシ		<i>Papaver dubium</i>	大塚町、大藪町、立花町、八坂町、日夏町、柳川町、芹川、湖岸					帰化
	ヒナゲシ		<i>Papaver rhoeas</i>	東沼波町、芹川					
	ヒメエンゴサク		<i>Corydalis lineariloba var. capillaris</i>	男鬼町、善谷町、仏生寺町					
	ミヤマキケマン		<i>Corydalis pallida var. tenuis</i>	善谷町、仏生寺町					
	ムラサキケマン		<i>Corydalis incisa</i>	金亀町、荘厳寺町、立花町、八坂町、仏生寺町、古沢町、犬上川、佐和山、彦根城					
アブラナ	イヌガラシ		<i>Rorippa indica</i>	男鬼町、尾末町、小野町、清崎町、金亀町、笹尾町、八坂町、原町、日夏町、古沢町、松原町、宮田町、安清町、彦根城、芹川、佐和山					
	イヌナズナ		<i>Draba nemorosa</i>				Ⅲ	C	
	オオバタネツケバナ		<i>Cardamine scutata</i>	男鬼町、小野町、清崎町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、芹橋、善谷町、長曾根南町、古沢町、本庄町、松原町、荒神山、愛知川、彦根城					
	オランダガラシ	クレソン	<i>Nasturtium officinale</i>	大塚町、笹尾町、中藪町、仏生寺町、芹川、矢倉川					帰化
	カラシナ		<i>Brassica juncea var. cernua</i>	大塚町、大藪町、清崎町、金亀町、下稲葉町、鳥居本町、野瀬町、平田町、松原町、柳川町、犬上川、愛知川、芹川、平田川、佐和山、湖岸					帰化
	コンロンソウ		<i>Cardamine leucantha</i>	大塚町、野田山町、八坂町、本庄町、犬上川、愛知川、芹川					
	ジャンジシ		<i>Cardamine impatiens</i>	大塚町、男鬼町、仏生寺町、芹川					
	スカシタゴボウ		<i>Rorippa islandica</i>	大藪町、開出今町、清崎町、立花町、平田町、松原町、宮田町、山之脇町、芹川、野田沼、佐和山					
	スズシロソウ		<i>Arabis flagellosa</i>	男鬼町					
	セイヨウアブラナ		<i>Brassica napus</i>	松原町、芹川					帰化
	ダイコン		<i>Raphanus sativus</i>	新海町、松原町、湖岸					逸出
タチスズシロソウ		<i>Arabis kawasakiana</i>		VU	A	Ⅱ	C		

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
アブラナ	タチタネツケバナ		<i>Cardamine flexuosa subsp. fallax</i>	下稲葉町、新海町、本庄町、三津屋町、曾根沼、愛知川、湖岸					
	タネツケバナ		<i>Cardamine flexuosa</i>	大藪町、金亀町、笹尾町、新海町、鳥居本町、野瀬町、八坂町、平田町、普光寺町、仏生寺町、本庄町、松原町、宮田町、安清東町、芹川、愛知川、湖岸、彦根城					史前帰化
	ナズナ		<i>Capsella bursa-pastoris</i>	金亀町、新海町、長曾根南町、野瀬町、八坂町、平田町、柳川町、犬上川、彦根城、湖岸					史前帰化
	ハクサンハタザオ		<i>Arabis gemmifera</i>	東沼波町、芹川					
	ハタザオ		<i>Arabis glabra</i>	石寺町、薩摩町、柳川町、湖岸					
	ハナダイコン	シヨカツサイ、オオアラセイトウ	<i>Orychophragmus violaceus</i>	新海町、本庄町、愛知川、犬上川					帰化
	ヒメイヌガラシ		<i>Rorippa × islandica</i>	小野町、甲崎町、薩摩町、松原町					
	マメグンバイナズナ		<i>Lepidium virginicum</i>	大藪町、尾末町、清崎町、金亀町、薩摩町、長曾根町、長曾根南町、日夏町、松原町、柳川町、平田川、愛知川、彦根城、雨壺山、湖岸					帰化
	マルバコンロンソウ		<i>Cardamine tanakae</i>	男鬼町、善谷町					
	ミズタガラシ		<i>Cardamine lyrata</i>	清崎町、田附町、肥田町、三津屋町、曾根沼					
	ミチタネツケバナ		<i>Cardamine hirsuta</i>	笹尾町、薩摩町、鳥居本町、長曾根南町、松原町、三津屋町、曾根沼					帰化
ワサビ		<i>Eutrema japonica</i>	開出今町、佐和山町、鳥居本町、原町、犬上川						
マンサク	イスノキ		<i>Distylium racemosum</i>	金亀町、彦根城					
	マンサク		<i>Hamamelis japonica</i>	男鬼町、笹尾町					
	モミジバフウ		<i>Liquidambar styraciflua</i>	新海町					植栽
ベンケイソウ	オノマンネングサ		<i>Sedum lineare</i>	清崎町、長曾根南町、平田川、芹川					逸出
	キリンソウ		<i>Sedum aizoon var. floribundum</i>	柳川町					逸出
	コモチマンネングサ		<i>Sedum bulbiferum</i>	大藪町、広野町、金亀町、笹尾町、立花町、野瀬町、松原町、三津屋町、宮田町、犬上川、芹川、曾根沼、彦根城					史前帰化
	ツルマンネングサ		<i>Sedum sarmentosum</i>	安清町					帰化
	マルバマンネングサ		<i>Sedum makinoi</i>	金亀町、城町、長曾根南町					
	メキシコマンネングサ		<i>Sedum mexicanum</i>	新海町、東沼波町、芹川					帰化
	メノマンネングサ		<i>Sedum japonicum</i>	金亀町、芹中町、芹川、彦根城					
ユキノシタ	アイノコバイカウツギ		<i>Philadelphus satsumi var. × kiotoensis</i>	仏生寺町					
	アジサイ		<i>Hydrangea macrophylla</i>	金亀町、彦根城					
	イワガラミ		<i>Schizophragma hydrangeoides</i>	男鬼町、笹尾町					
	ウツギ		<i>Deutzia crenata</i>	石寺町、男鬼町、小野町、笹尾町、仏生寺町、武奈町、本庄町、宮田町、荒神山					
	ウラジロウツギ		<i>Deutzia maximowicziana</i>	男鬼町					
	エゾアジサイ		<i>Hydrangea macrophylla var. megacarpa</i>	男鬼町、仏生寺町、本庄町、愛知川					
	ガクアジサイ		<i>Hydrangea macrophylla f. normalis</i>	金亀町、彦根城					帰化
	ギンバイソウ		<i>Deinathe bifida</i>	男鬼町					
	コアジサイ		<i>Hydrangea hirta</i>	男鬼町、笹尾町、野田山町					
	コチャルメルソウ		<i>Mitella pauciflora</i>	開出今町、本庄町、犬上川、愛知川					
	シコクウツギ		<i>Philadelphus satsumi var. lancifolius</i>	仏生寺町					
	タキミチャルメルソウ	ハリベンチャルメルソウ	<i>Mitella stylosa</i>	男鬼町、正法寺町、鳥居本町、中山町、原町、仏生寺町	VU		V		
	タコノアシ		<i>Penthorum chinense</i>		VU	C	VI	D	

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ユキノシタ	チダケサシ		<i>Astilbe microphylla</i>					B	
	トリアシショウマ		<i>Astilbe thunbergii</i> var. <i>congesta</i>	男鬼町、荘厳寺町					
	ニッコウバイカウツギ		<i>Philadelphus satsumi</i> var. <i>nikoensis</i>	仏生寺町、武奈町					
	ネコノメソウ		<i>Chrysosplenium grayanum</i>	男鬼町					
	ノリウツギ		<i>Hydrangea paniculata</i>	男鬼町、笹尾町、荒神山、佐和山					
	バイカウツギ		<i>Philadelphus satsumi</i>	仏生寺町					
	ホクリクネコノメソウ		<i>Chrysosplenium fauriei</i>	男鬼町					
	ボタンネコノメソウ		<i>Chrysosplenium fauriei</i> var. <i>kiotense</i>	男鬼町					
	ヤブサンザシ		<i>Ribes fasciculatum</i>	荘厳寺町、仏生寺町					
	ヤマアジサイ		<i>Hydrangea macrophylla</i> var. <i>acuminata</i>	男鬼町、笹尾町、本庄町					
	ヤマネコノメソウ		<i>Chrysosplenium japonicum</i>	金亀町、荘厳寺町、服部町、古沢町、本庄町、本町、宮田町、愛知川、荒神山、彦根城					
ユキノシタ		<i>Saxifraga stolonifera</i>	清崎町、金亀町、彦根城						
トベラ	トベラ		<i>Pittosporum tobira</i>	金亀町、薩摩町、佐和山、彦根城、湖岸					逸出
バラ	アイノコフユイチゴ		<i>Rubus pseudohakonenis</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、善谷町、武奈町、宮田町、彦根城					
	アズキナシ		<i>Sorbus alnifolia</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、正法寺町、鳥居本町、原町、雨壺山、荒神山、彦根城					
	イヌザクラ		<i>Prunus buergeriana</i>	男鬼町、笹尾町、本庄町、愛知川、荒神山					
	ウメ		<i>Prunus mume</i>	金亀町、雨壺山、彦根城					帰化
	ウラジロノキ		<i>Sorbus japonica</i>	男鬼町、笹尾町					
	ウワミズザクラ		<i>Prunus grayana</i>	大堀町、男鬼町、金亀町、笹尾町、中山町、仏生寺町、本庄町、松原町、三津屋町、和田町、愛知川、矢倉川、荒神山、曾根沼、彦根城					
	エドヒガン		<i>Prunus pendula</i> f. <i>ascendens</i>	金亀町、彦根城					植栽
	エビガライチゴ		<i>Rubus phoenicolasius</i>	広野町、荘厳寺町、鳥居本町、仏生寺町、犬上川					
	オオトックリイチゴ		<i>Rubus</i> × <i>hiraseanus</i>				I	D	
	オヘビイチゴ		<i>Potentilla sundaica</i> var. <i>robusta</i>	男鬼町、開出今町、金亀町、笹尾町、芹橋、中山町、武奈町、本庄町、三津屋町、曾根沼、彦根城					
	カスミザクラ		<i>Prunus verecunda</i>	金亀町、笹尾町、八坂町、原町、仏生寺町、古沢町、雨壺山、彦根城					
	カナメモチ		<i>Photinia glabra</i>	大堀町、金亀町、肥田町、古沢町、雨壺山、荒神山、彦根城					
	カマツカ		<i>Pourthiaea villosa</i> var. <i>laevis</i>	大堀町、笹尾町、原町					
	カワラサイコ		<i>Potentilla chinensis</i>			A	VI	D	
	キンキマメザクラ		<i>Prunus incisa</i> var. <i>kinkiensis</i>	男鬼町、武奈町					
	キンミズヒキ		<i>Agrimonia japonica</i>	大堀町、男鬼町、開出今町、金亀町、笹尾町、善谷町、武奈町、古沢町、本庄町、犬上川、佐和山、彦根城					
	クサイチゴ		<i>Rubus hirsutus</i>	中山町、原町、仏生寺町、佐和山					
	クマイチゴ		<i>Rubus crataegifolius</i>	笹尾町、鳥居本町、宮田町					
	ケカマツカ		<i>Pourthiaea villosa</i> var. <i>zollingeri</i>	笹尾町、中山町、武奈町					
	コジキイチゴ		<i>Rubus sumatranus</i>	金亀町、笹尾町、日夏町、三津屋町、荒神山、曾根沼、彦根城					
シャリンバイ		<i>Rhaphiolepis umbellata</i>	金亀町、八坂町、彦根城						
ズミ		<i>Malus toringo</i>	立花町						
ダイコンソウ		<i>Geum japonicum</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、新町、鳥居本町、武奈町、古沢町、宮田町、和田町、雨壺山、佐和山、彦根城						

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
バラ	タチバナモドキ		<i>Pyracantha angustifolia</i>	金亀町、彦根城					植栽
	ナガバモミジイチゴ		<i>Rubus palmatus</i>	笹尾町、荘厳寺町、善谷町、武奈町					
	ナガボノワレモコウ		<i>Sanguisorba tenuifolia</i>			A	VI	E	
	ナワシロイチゴ		<i>Rubus parvifolius</i>	大藪町、金亀町、笹尾町、新海町、長曾根町、八坂町、松原町、和田町、犬上川、芹川、平田川、雨壺山、彦根城					
	ナンキンナナカマド		<i>Sorbus gracilis</i>	武奈町					
	ニガイチゴ		<i>Rubus microphyllus</i>	笹尾町、仏生寺町、古沢町、荒神山					
	ノイバラ		<i>Rosa multiflora</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、新海町、八坂町、松原町、三津屋町、曾根沼、野田沼、彦根城					
	ヒメキンミズヒキ		<i>Agrimonia nipponica</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、仏生寺町、彦根城					
	ビワ		<i>Eriobotrya japonica</i>	金亀町、彦根城					帰化
	フユイチゴ		<i>Rubus buergeri</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、下稲葉町、鳥居本町、仏生寺町、武奈町、古沢町、宮田町、山之脇町、犬上川、愛知川、雨壺山、彦根城					
	ベニシダレ		<i>Prunus pendula</i> cv. <i>Pendula-rosea</i>	金亀町、彦根城					植栽
	ヘビイチゴ		<i>Duchesnea chrysantha</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、中央町、日夏町、古沢町、本庄町、愛知川、佐和山、彦根城					
	マルバシヤリンバイ		<i>Rhaphiolepis umbellata</i> var. <i>integerrima</i>	尾末町、清崎町、金亀町、正法寺町、馬場、彦根城					植栽
	ミツバツチグリ		<i>Potentilla freyniana</i>	男鬼町、笹尾町、古沢町、佐和山					
	ミヤコイバラ		<i>Rosa paniculigera</i>	男鬼町、笹尾町、野田山町、原町、古沢町					
	ミヤマフユイチゴ		<i>Rubus hakonensis</i>	男鬼町、笹尾町、仏生寺町					
	モモ		<i>Prunus persica</i>	仏生寺町			準		逸出？
	ヤブヘビイチゴ		<i>Duchesnea indica</i>	金亀町、笹尾町、下稲葉町、新町、芹橋、仏生寺町、古沢町、宮田町、和田町、犬上川、愛知川、雨壺山、荒神山、彦根城					
	ヤマザクラ		<i>Prunus jamasakura</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、正法寺町、中山町、原町、三津屋町、雨壺山、曾根沼、彦根城					
	ヤマナシ		<i>Pyrus pyrifolia</i>						D
	ヤマブキ		<i>Kerria japonica</i>	荘厳寺町、善谷町、犬上川、雨壺山					
	ユキヤナギ		<i>Spiraea thunbergii</i>	金亀町、彦根城			準		植栽
リンボク		<i>Prunus spinulosa</i>	金亀町、彦根城						
ワタゲカマツカ		<i>Pourthiaea villosa</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、田附町、仏生寺町、本庄町、愛知川、荒神山、佐和山、彦根城						
ワレモコウ		<i>Sanguisorba officinalis</i>	清崎町						
マメ	アカツメクサ	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i>	河原、後三条町、金亀町、長曾根町、八坂町、日夏町、松原町、芹川、野田沼、雨壺山					帰化
	アレチヌスビトハギ		<i>Desmodium paniculatum</i>	大堀町、金亀町、須越町、芹橋、野瀬町、八坂町、日夏町、平田町、松原町、三津屋町、和田町、芹川、曾根沼					帰化
	イタチハギ		<i>Amorpha fruticosa</i>	男鬼町、清崎町、新海町、長曾根町、仏生寺町、松原町、矢倉川、荒神山、湖岸					帰化
	ウマゴヤシ		<i>Medicago polymorpha</i>	大藪町、新海町、芹橋、日夏町、荒神山					帰化
	エビスグサ		<i>Cassia obtusifolia</i>	新海町					植栽
	エンジュ		<i>Sophora japonica</i>	尾末町					植栽
	カスマグサ		<i>Vicia tetrasperma</i>	金亀町、笹尾町、下稲葉町、八坂町、松原町、愛知川					
	カラスノエンドウ		<i>Vicia sepium</i>	清崎町、金亀町、笹尾町、下稲葉町、下西川町、須越町、芹橋、長曾根町、野瀬町、八坂町、日夏町、三津屋町、愛知川、芹川、曾根沼、野田沼、彦根城					
	カワチハギ		<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> f. <i>kawachiana</i>	佐和山町					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
マメ	カワラケツメイ		<i>Cassia mimosoides ssp. nomame</i>					D	
	キハギ		<i>Lespedeza buergeri</i>	八坂町					
	クサネム		<i>Aeschynomene indica</i>	開出今町、清崎町、笹尾町、長曾根町、八坂町、日夏町、松原町、三津屋町、犬上川、平田川、曾根沼、野田沼、湖岸					史前帰化
	クズ		<i>Pueraria lobata</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、田附町、長曾根町、野瀬町、八坂町、日夏町、平田町、三津屋町、愛知川、犬上川、芹川、平田川、雨壺山、荒神山、曾根沼、彦根城					
	クララ		<i>Sophora flavescens</i>	新海町、芹川					
	ケハイメドハギ		<i>Lespedeza serpens f. hirta</i>	笹尾町					
	ケハネミヌエンジュ		<i>Maackia floribunda f. pubescens</i>	男鬼町、野田山町、松原町					
	ケヤブハギ		<i>Desmodium podocarpium ssp. fallax</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町					
	ゲンゲ	レンゲソウ	<i>Astragalus sinicus</i>	金亀町、笹尾町、宮田町					帰化
	コマツナギ		<i>Indigofera pseudotinctoria</i>	宇尾町、広野町、笹尾町、薩摩町、長曾根町、八坂町、東沼波町、古沢町、松原町、犬上川、芹川、湖岸					
	コメツブウマゴヤシ		<i>Medicago lupulina</i>	宇尾町、金亀町、幸町、馬場、雨壺山					帰化
	コメツブツメクサ		<i>Trifolium dubium</i>	尾末町、河原、清崎町、小泉町、金亀町、笹尾町、薩摩町、新海町、中央町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、三津屋町、愛知川、芹川、荒神山、曾根沼、彦根城、湖岸					帰化
	サイカチ		<i>Gleditsia japonica</i>	池州町、後三条町、中藪町、芹川		準		IV	植栽
	シャグマハギ		<i>Trifolium arvense</i>	新海町、愛知川					帰化
	シロツメクサ	オランダゲンゲ	<i>Trifolium repens</i>	大藪町、尾末町、開出今町、金亀町、笹尾町、長曾根町、日夏町、古沢町、松原町、三津屋町、平田川、曾根沼、彦根城、湖岸					帰化
	シロバナシナガワハギ		<i>Mellilotus alba</i>	石寺町					
	スズメノエンドウ		<i>Vicia hirsuta</i>	金亀町、薩摩町、八坂町、松原町、平田川、彦根城					
	タンキリマメ		<i>Rhynchosia volubilis</i>	佐和山町、新海町、野瀬町、松原町、佐和山					
	ツクシハギ		<i>Lespedeza homoloba</i>	男鬼町、笹尾町、佐和山町、荘厳寺町、正法寺町、善谷町、古沢町、宮田町、荒神山、佐和山					
	ツルマメ		<i>Glycine max ssp. soja</i>	笹尾町、新海町、鳥居本町、平田町、古沢町、松原町、安清町、野田沼					
	トキリマメ		<i>Rhynchosia acuminatifolia</i>	笹尾町、佐和山					
	ナツフジ		<i>Milletia japonica</i>						D
	ナヨクサフジ		<i>Vicia dasycarpa var. glabrescens</i>	大堀町、河原、芹橋、芹川					帰化
	ニシキハギ		<i>Lespedeza nipponica</i>	笹尾町、荘厳寺町					植栽
	ニセアカシア	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i>	開出今町、薩摩町					帰化
	ヌスピトハギ		<i>Desmodium podocarpium ssp. oxyphyllum</i>	大堀町、男鬼町、金亀町、笹尾町、里根町、佐和山町、荘厳寺町、仏生寺町、古沢町、宮田町、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	ネコハギ		<i>Lespedeza pilosa</i>	男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、古沢町、佐和山					
	ネムノキ		<i>Albizia julibrissin</i>	大堀町、尾末町、金亀町、笹尾町、古沢町、宮田町、和田町、平田川					
	ノアズキ	ヒメクズ	<i>Dunbaria villosa</i>	笹尾町、荘厳寺町					
	ノササゲ		<i>Dumasia truncata</i>	笹尾町					
	ハマエンドウ		<i>Lathyrus japonicus</i>					I	B
	ピッチユウヤマハギ		<i>Lespedeza thunbergii var. albiflora f. angustifolia</i>	古沢町、佐和山					
フサアカシア		<i>Acacia decurrens var. dealbata</i>	八坂町					植栽	
フジ		<i>Wisteria floribunda</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、彦根城						

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
マメ	フジカンソウ		<i>Desmodium oldhamii</i>	笹尾町、佐和山					
	ホンバヤハズノエンドウ		<i>Vicia angustifolia var. minor</i>	松原町					帰化
	マキエハギ		<i>Lespedeza virgata</i>			C	IV	B	
	マルバヌズビトハギ		<i>Desmodium podocarpium</i>	金亀町、里根町、正法寺町、善谷町、鳥居本町、古沢町、平田川、佐和山、彦根城					
	マルバハギ		<i>Lespedeza cyrtobotrya</i>	男鬼町					
	マルバヤハズソウ		<i>Kummerowia stipulacea</i>	石寺町、清崎町、新海町、八坂町、古沢町、犬上川					
	ミヤコグサ		<i>Lotus corniculatus var. japonicus</i>	清崎町、笹尾町、荘厳寺町、新海町、鳥居本町					史前帰化
	ムラサキウマゴヤシ		<i>Medicago sativa</i>	石寺町					帰化
	メドハギ		<i>Lespedeza cuneata</i>	石寺町、大藪町、男鬼町、清崎町、金亀町、笹尾町、正法寺町、新海町、鳥居本町、八坂町、日夏町、松原町、三津屋町、平田川、雨壺山、湖岸					史前帰化
	モモイロツメクサ		<i>Trifolium repens f. roseum</i>	笹尾町、新海町、三津屋町、曾根沼					帰化
	モンツキウマゴヤシ		<i>Medicago arabica</i>	金亀町、城町、西今町、松原町、荒神山、彦根城					帰化
	ヤハズソウ		<i>Kummerowia striata</i>	大藪町、清崎町、笹尾町、新海町、八坂町、日夏町、平田町、本庄町、松原町、愛知川、芹川、荒神山、野田沼					史前帰化
	ヤブツルアズキ		<i>Vigna angularis var. nipponensis</i>	大塚町、栄町、芹町、中山町、野瀬町、八坂町、平田町、古沢町、松原町、宮田町、安清町、安清東町、芹川、佐和山					帰化
	ヤブハギ		<i>Desmodium podocarpium ssp. oxyphyllum var. mandshuricum</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、武奈町、古沢町、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ヤブマメ		<i>Amphicarpea bracteata ssp. edgeworthii var. japonica</i>	開出今町、金亀町、笹尾町、鳥居本町、野田山町、古沢町、犬上川、雨壺山、荒神山、佐和山					
ヤマハギ		<i>Lespedeza bicolor</i>	男鬼町、鳥居本町、矢倉川						
カタバミ	アカカタバミ		<i>Oxalis corniculata f. rubrifolia</i>	金亀町、日夏町、彦根城					
	イモカタバミ		<i>Oxalis articulate</i>	大藪町、長曾根南町、湖岸					帰化
	ウスアカカタバミ		<i>Oxalis corniculata f. tropaeoroides</i>	尾末町、金亀町、彦根城					
	オッタチカタバミ		<i>Oxalis stricta</i>	金亀町、笹尾町、下稲葉町、八坂町、原町、日夏町、松原町、愛知川、荒神山、彦根城					帰化
	カタバミ		<i>Oxalis corniculata</i>	大藪町、金亀町、笹尾町、薩摩町、長曾根町、古沢町、三津屋町、元町、芹川、平田川、雨壺山、曾根沼、彦根城					史前帰化
	ホシザキカタバミ		<i>Oxalis corniculata f. plena</i>	八坂町					
	ミヤマカタバミ	ヤマカタバミ	<i>Oxalis griffithii</i>	男鬼町、善谷町、八坂町、原町、犬上川					
	ムラサキカタバミ		<i>Oxalis corymbosa</i>	稲里町、金亀町、立花町、芹川、彦根城					帰化
フウロソウ	アメリカフウロ		<i>Geranium carolinianum</i>	大藪町、尾末町、清崎町、薩摩町、須越町、中央町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、野田沼					帰化
	オランダフウロ		<i>Erodium cicutarium</i>	三津屋町					帰化
	ゲンノショウコ		<i>Geranium thunbergii</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、佐和山町、芹川町、鳥居本町、武奈町、古沢町、宮田町、和田町、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ヒメフウロ		<i>Geranium robertianum</i>	芹川		C			
	ミツバフウロ		<i>Geranium wilfordii</i>	武奈町					
アマ	アマ		<i>Linum usitatissimum</i>	松原町					帰化
トウダイグサ	アカマガシワ		<i>Mallotus japonicus</i>	大藪町、金亀町、笹尾町、新海町、野田山町、仏生寺町、古沢町、芹川、平田川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	アブラギリ		<i>Aleurites cordata</i>	仏生寺町					帰化

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
トウダイグサ	エノキグサ		<i>Acalypha australis</i>	大藪町、小野町、開出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、立花町、田附町、長曾根南町、日夏町、普光寺町、本庄町、松原町、三津屋町、雨壺山、彦根城					史前帰化
	オオニシキソウ		<i>Euphorbia maculata</i>	大堀町、開出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、薩摩町、佐和山町、新海町、芹川町、八坂町、日夏町、平田町、古沢町、松原町、三津屋町、宮田町、和田町、雨壺山、佐和山					帰化
	コニシキソウ		<i>Euphorbia supina</i>	京町、清崎町、金亀町、笹尾町、薩摩町、立花町、野瀬町、日夏町、普光寺町、仏生寺町、松原町、和田町、平田川、彦根城					帰化
	シラキ		<i>Sapium japonicum</i>	大堀町、男鬼町					
	トウダイグサ		<i>Euphorbia helioscopia</i>	石寺町、金亀町、大東町、中藪、古沢町、犬上川、芹川、彦根城					
	ナガエコミカンソウ		<i>Phyllanthus tenellus</i>	里根町、立花町					
	ナツトウダイ		<i>Euphorbia sieboldiana</i>	男鬼町、笹尾町					
	ナンキンハゼ		<i>Sapium sebiferum</i>	尾末町、金亀町、薩摩町、新海町、八坂町、松原町、柳川町、平田川、野田沼、彦根城、湖岸					帰化
	ニシキソウ		<i>Euphorbia pseudochamaesyce</i>	石寺町、京町、清崎町、金亀町、薩摩町、新海町、芹町、立花町、鳥居本町、八坂町、仏生寺町、松原町、彦根城					史前帰化
	ノウルシ		<i>Euphorbia adenochlora</i>		VU	C	VI	D	
	ハツユキソウ		<i>Euphorbia marginata</i>	鳥居本町、佐和山					帰化
	ヒメミカンソウ		<i>Phyllanthus matsumurae</i>	笹尾町					史前帰化
	ビロードエノキグサ		<i>Acalypha australis var. velutina</i>	石寺町、小野町、新海町、平田町、普光寺町					
ヤマアイ		<i>Mercurialis leiocarpa</i>	宇尾町、男鬼町、八坂町、犬上川						
ユズリハ	エゾユズリハ		<i>Daphniphyllum macropodum var. humile</i>	男鬼町、武奈町					
	ユズリハ		<i>Daphniphyllum macropodum</i>	金亀町、荒神山、彦根城					
ミカン	イヌザンショウ		<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	男鬼町、新町、和田町					
	カラスザンショウ		<i>Zanthoxylum ailanthoides</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、芹川町、彦根城					
	コクサギ		<i>Orixa japonica</i>	仏生寺町					
	サンショウ		<i>Zanthoxylum piperitum</i>	小野町、金亀町、彦根城					
	タチバナ		<i>Citrus tachibana</i>	金亀町、古沢町	VU	C			植栽
	ツルシキミ	ツルミヤマシキミ	<i>Skimmia japonica var. intermedia f. repens</i>	男鬼町					
	マツカゼソウ		<i>Boenninghausenia japonica</i>	男鬼町、笹尾町、仏生寺町					
ヤマアサクラザンショウ		<i>Zanthoxylum piperitum f. brevispinosum</i>	莊厳寺町						
ニガキ	シンジュ	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i>	大堀町、尾末町、金亀町、三津屋町、曾根沼					帰化
	ニガキ		<i>Picrasma quassioides</i>	大堀町					
センダン	センダン	オウチ	<i>Melia azedarach</i>	金亀町、薩摩町、新海町、長曾根町、八坂町、三津屋町、荒神山、曾根沼、彦根城					
ヒメハギ	ヒメハギ		<i>Polygala japonica</i>	笹尾町					
ウルシ	ツタウルシ		<i>Rhus ambigua</i>	笹尾町					
	ヌルデ	フシノキ	<i>Rhus javanica var. roxburghii</i>	清崎町、金亀町、笹尾町、新海町、古沢町、宮田町、平田川、荒神山、彦根城					
	ハゼノキ		<i>Rhus succedanea</i>	金亀町、松原町、雨壺山、彦根城					
	ヤマウルシ		<i>Rhus trichocarpa</i>	男鬼町、笹尾町、荒神山					
	ヤマハゼ		<i>Rhus sylvestris</i>	稲里町、金亀町、笹尾町、里根町、松原町、山之脇町、矢倉川、彦根城					
カエデ	イタヤカエデ		<i>Acer mono</i>	笹尾町、莊厳寺町、仏生寺町、松原町					
	イトマキイタヤ		<i>Acer mono var. trichobasis</i>	男鬼町					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
カエデ	イロハモミジ		<i>Acer palmatum</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、日夏町、古沢町、彦根城					
	ウリカエデ		<i>Acer crataegifolium</i>	男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、原町、佐和山					
	ウリハダカエデ		<i>Acer rufinerve</i>	男鬼町、善谷町、佐和山					
	エンコウカエデ		<i>Acer mono f. marmoratum</i>	善谷町					
	オオモミジ		<i>Acer amoenum</i>	男鬼町、金亀町、中山町、古沢町、彦根城					
	カラコギカエデ		<i>Acer ginnala var. aidzuense</i>				IV	B	
	コハウチワカエデ		<i>Acer sieboldianum</i>	男鬼町、笹尾町					
	チドリノキ		<i>Acer carpinifolium</i>	男鬼町					
	トウカエデ		<i>Acer buergerianum</i>	八坂町、荒神山					
ミツデカエデ		<i>Acer cissifolium</i>						D	
アワブキ	アワブキ		<i>Meliosma myriantha</i>	男鬼町、仏生寺町					
	ミヤマハハソ		<i>Meliosma tenuis</i>	男鬼町					
ツリフネソウ	キツリフネ		<i>Impatiens noli-tangere</i>	男鬼町、鳥居本町、仏生寺町					
	ツリフネソウ		<i>Impatiens textori</i>	男鬼町、笹尾町					
モチノキ	アオハダ		<i>Ilex macropoda</i>	笹尾町、正法寺町、善谷町、鳥居本町、野田山町、松原町、荒神山					
	イヌツゲ		<i>Ilex crenata</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、彦根城					
	イヌウメモドキ		<i>Ilex serrata f. argutidens</i>	笹尾町					
	ウメモドキ		<i>Ilex serrata</i>	石寺町、金亀町、笹尾町、芹川町、善谷町、荒神山、彦根城					
	クロガネモチ		<i>Ilex rotunda</i>	金亀町、野瀬町、八坂町、松原町、元町、和田町、雨壺山、荒神山、彦根城					
	ソヨゴ		<i>Ilex pedunculosa</i>	大堀町、笹尾町、正法寺町、野田山町、日夏町、雨壺山、荒神山					
	タラヨウ		<i>Ilex latifolia</i>	金亀町、彦根城					
	モチノキ		<i>Ilex integra</i>	金亀町、八坂町、古沢町、雨壺山、彦根城					
ニシキギ	イヌツルウメモドキ		<i>Celastrus orbiculatus f. papillosus</i>	新海町、芹川町					
	オニツルウメモドキ		<i>Celastrus orbiculatus var. papillosus</i>	仏生寺町、雨壺山					
	カントウマユミ		<i>Euonymus sieboldianus var. sanguineus</i>	八坂町、本庄町、犬上川、雨壺山					
	コマユミ		<i>Euonymus alatus f. ciliato-dentatus</i>	大堀町、男鬼町、笹尾町、中山町、本庄町、雨壺山、佐和山					
	サワダツ	アオジクマユミ	<i>Euonymus melananthus</i>	男鬼町					
	ソガイコマユミ		<i>Euonymus alatus var. arakianus</i>	大堀町、笹尾町、田附町、原町、古沢町、本庄町、愛知川、雨壺山					
	ツリバナ		<i>Euonymus oxyphyllus</i>	男鬼町、中山町					
	ツルウメモドキ		<i>Celastrus orbiculatus</i>	新海町、武奈町、古沢町、松原町					
	マサキ		<i>Euonymus japonicus</i>	金亀町、長曾根町、芹川、彦根城					逸出
	マユミ		<i>Euonymus sieboldianus</i>	金亀町、武奈町、彦根城					
ミツバウツギ	ゴンズイ		<i>Euscaphis japonica</i>	笹尾町、三津屋町、荒神山、曾根沼					
	ミツバウツギ		<i>Staphylea bumalda</i>	男鬼町、正法寺町					
クロウメモドキ	イソノキ		<i>Frangula crenata</i>	笹尾町、荒神山、佐和山					
	ケケンボナシ		<i>Hovenia trichocarpa</i>	武奈町					
	ケンボナシ		<i>Hovenia dulcis</i>	大堀町、男鬼町、金亀町、笹尾町、仏生寺町、芹川、彦根城					
	ナツメ		<i>Ziziphus jujuba</i>	後三条町					植栽
ブドウ	エビヅル		<i>Vitis ficifolia var. lobata</i>	金亀町、笹尾町、田附町、松原町、三津屋町、犬上川、愛知川、雨壺山、曾根沼、彦根城					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ブドウ	オトコブドウ	アマツル	<i>Vitis saccharifera</i>	男鬼町、笹尾町、原町、荒神山、佐和山					
	キクバエビヅル		<i>Vitis ficifolia var. lobata f. sinuata</i>	田附町、古沢町、愛知川					
	キレハノブドウ		<i>Ampelopsis glandulosa var. heterophylla f. citrulloides</i>	笹尾町、田附町、八坂町、愛知川、雨壺山、佐和山					
	サンカクヅル	ギョウジャノミズ	<i>Vitis flexuosa</i>	男鬼町、仏生寺町					
	ツタ	ナツツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	金亀町、笹尾町、馬場、芹川、雨壺山、彦根城					
	ノブドウ		<i>Ampelopsis glandulosa var. heterophylla</i>	大堀町、男鬼町、後三条町、金亀町、笹尾町、正法寺町、新町、竹ヶ鼻町、田附町、八坂町、仏生寺町、古沢町、松原町、宮田町、和田町、愛知川、芹川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	ヤブガラシ		<i>Cayratia japonica</i>	開出今町、金亀町、長曾根町、野瀬町、八坂町、平田町、古沢町、松原町、犬上川、平田川、雨壺山、彦根城					
シナノキ	シナノキ		<i>Tilia japonica</i>	武奈町					
アオイ	アメリカキンゴジカ		<i>Sida spinosa</i>	松原町					帰化
	イチビ		<i>Abutilon theophrasti</i>	清崎町、松原町					帰化
	ウサギアオイ		<i>Malva parviflora</i>	薩摩町、松原町					帰化
	ゼニアオイ		<i>Malva sylvestris var. mauritiana</i>	鳥居本町、長曾根南町					帰化
	ゼニバアオイ		<i>Malva neglecta</i>	松原町					帰化
	タチアオイ		<i>Althaea rosea</i>	金亀町、本町					帰化
	フヨウ		<i>Hibiscus mutabilis</i>	外町					帰化
	ムクゲ		<i>Hibiscus syriacus</i>	金亀町、彦根城					植栽
ジンショウゲ	オニシバリ	ナツボウス	<i>Daphne pseudo-mezereum</i>	男鬼町、善谷町、仏生寺町、武奈町					
ゲミ	アキグミ		<i>Elaeagnus umbellata</i>	笹尾町、野田山町					
	ツルグミ		<i>Elaeagnus glabra</i>	金亀町、笹尾町、佐和山、彦根城					
	ナツグミ		<i>Elaeagnus multiflora var. crispa</i>	笹尾町、武奈町					
	ナワシログミ		<i>Elaeagnus pungens</i>	大堀町、金亀町、正法寺町、古沢町、雨壺山、彦根城					
	マルバツルグミ		<i>Elaeagnus × reflexa</i>	雨壺山					
スミレ	アオイスミレ		<i>Viola hondoensis</i>	荘厳寺町、鳥居本町、原町					
	アギスミレ		<i>Viola verecunda var. semilunaris</i>	笹尾町					
	アリアケスミレ		<i>Viola betonicifolia var. albescens</i>	男鬼町、金亀町、佐和町、芹川町、芹橋、彦根城					
	オオタチツボスミレ		<i>Viola kusanoana</i>	男鬼町、武奈町					
	ケナシスミレ		<i>Viola mandshurica f. glabra</i>	薩摩町、八坂町、柳川町、湖岸					
	コスミレ		<i>Viola japonica</i>	小野町、笹尾町、善谷町、鳥居本町、錦町、古沢町、元町、佐和山					
	山陰型タチツボスミレ		<i>Viola sp.</i>	小野町、笹尾町、下稲葉町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、原町、日夏町、愛知川、荒神山、佐和山					
	シハイスミレ		<i>Viola violacea</i>	男鬼町、小野町、笹尾町、善谷町、鳥居本町、原町、芹川					
	スミレ		<i>Viola mandshurica</i>	清崎町、薩摩町、荘厳寺町、大東町、本庄町、愛知川、芹川					
	タチツボスミレ		<i>Viola grypoceras</i>	石寺町、稲里町、男鬼町、小野町、金亀町、笹尾町、佐和町、佐和山町、下稲葉町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、野田山町、原町、元町、愛知川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	ツボスミレ		<i>Viola verecunda</i>	笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、古沢町、本庄町、三津屋町、愛知川、雨壺山、佐和山、曾根沼					
	ナガバノスミレサイシン		<i>Viola bissetii</i>						E
	ナガバナタチツボスミレ		<i>Viola ovato-oblonga</i>	石寺町、男鬼町、小野町、荒神山					
ニオイスミレ		<i>Viola odorata</i>	清崎町、古沢町、佐和山					帰化	

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
スミレ	ニオイタチツボスミレ		<i>Viola obtusa</i>	笹尾町、荘厳寺町					
	ノジスミレ		<i>Viola yedoensis</i>	男鬼町、尾末町、佐和町、下西川町、立花町、中央町、古沢町、佐和山					
	ヒメアギスミレ		<i>Viola verecunda var. excisa</i>	小野町、中山町、本庄町、愛知川					
	ヒメスミレ		<i>Viola minor</i>	小野町、芹川町、長曾根町、古沢町、本町、松原町、三津屋町、荒神山、曾根沼					
	フモトスミレ		<i>Viola pumilio</i>	笹尾町					
	マキノスミレ		<i>Viola makinoi</i>	男鬼町、笹尾町					
キブシ	キブシ		<i>Stachyurus praecox</i>	男鬼町、荘厳寺町、仏生寺町					
	ケキブシ		<i>Stachyurus praecox var. leucotrichus</i>	男鬼町					
ミゾハコベ	イヌミゾハコベ		<i>Elatine triandra var. triandra</i>	小野町、笹尾町、日夏町、佐和山					
	ミゾハコベ		<i>Elatine triandra var. pedicellata</i>	石寺町、小野町、笹尾町、松原町、三津屋町					
シュウカイドウ	シュウカイドウ		<i>Begonia evansiana</i>	善谷町、日夏町、荒神山					帰化
ウリ	アマチャヅル		<i>Gynostemma pentaphyllum</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、八坂町、古沢町、三津屋町、犬上川、荒神山、佐和山、曾根沼、彦根城					
	アレチウリ		<i>Sicyos angulatus</i>	金亀町、薩摩町、長曾根町、長曾根南町、馬場、平田川、彦根城、湖岸					帰化
	カラスウリ		<i>Trichosanthes cucumeroides</i>	金亀町、芹川町、田附町、八坂町、古沢町、和田町、犬上川、荒神山、佐和山、彦根城					
	キカラスウリ		<i>Trichosanthes kirilowii var. japonica</i>	金亀町、八坂町、彦根城、湖岸					
	ゴキヅル		<i>Actinostemma lobatum</i>	長曾根南町、松原町、三津屋町、曾根沼、平田川					
	スズメウリ		<i>Melothria japonica</i>	男鬼町、金亀町、佐和山町、新町、善谷町、八坂町、仏生寺町、古沢町、三津屋町、和田町、雨壺山、佐和山、曾根沼、彦根城					
ミソハギ	ウラゲイワガネ		<i>Coniogramme intermedia f. villosa</i>	荘厳寺町					
	キサシグサ		<i>Rotala indica var. uliginosa</i>	清崎町、笹尾町、薩摩町、中山町、野瀬町、肥田町、普光寺町、松原町					史前帰化
	ヒメミソハギ		<i>Ammannia multiflora</i>	石寺町、大藪町、開出今町、甘呂町、薩摩町、荘厳寺町、新海町、芹川町、鳥居本町、長曾根南町、八坂町、平田町、仏生寺町、古沢町、松原町、三津屋町、柳川町、犬上川、愛知川、平田川		C	VI		
	ホンバヒメミソハギ		<i>Ammannia coccinea</i>	大藪町、尾末町、開出今町、甘呂町、笹尾町、長曾根南町、八坂町、仏生寺町、犬上川					
	ミズマツバ		<i>Rotala pusilla</i>	石寺町、福里町、甘呂町、清崎町、薩摩町、新海町、松原町、三津屋町、南三ツ谷町	VU	C			
	ミソハギ		<i>Lythrum anceps</i>	笹尾町、佐和山町、新海町、田附町、日夏町、松原町、蓮台寺町、愛知川、湖岸					帰化
ヒシ	ヒシ		<i>Trapa japonica</i>	薩摩町、三津屋町、柳川町、曾根沼					
ザクロ	ザクロ		<i>Punica granatum</i>	金亀町、本町、彦根城					植栽・逸出
アカバナ	アカバナ		<i>Epilobium pyrricholophum</i>	大藪町、清崎町、笹尾町、善谷町、鳥居本町、野田山町、八坂町、松原町、安清東町、芹川、荒神山、野田沼、犬上川、佐和山					
	アメリカミズキンバイ	ヒレタゴボウ	<i>Ludwigia decurrens</i>	新海町、田附町、八坂町、本庄町、柳川町、犬上川、愛知川、湖岸					帰化
	アレチマツヨイグサ		<i>Oenothera perviflora</i>	中山町					帰化
	ウスゲチョウジタデ		<i>Ludwigia greatrexi</i>		NT			E	
	コマツヨイグサ		<i>Oenothera laciniata</i>	薩摩町、佐和町、下稲葉町、新海町、中央町、長曾根町、松原町、柳川町、愛知川、湖岸					帰化
	チョウジタデ		<i>Ludwigia epilobioides</i>	石寺町、大藪町、清崎町、笹尾町、薩摩町、新海町、須越町、野瀬町、八坂町、日夏町、平田町、松原町、愛知川、野田沼、佐和山					史前帰化
	ヒルザキツキミノウ		<i>Oenothera speciosa</i>	新海町、荒神山、愛知川					帰化
	マツヨイグサ		<i>Oenothera stricta</i>	大堀町、地藏町、新海町、八坂町、松原町、柳川町、湖岸					帰化
	ミズタマソウ		<i>Circaea mollis</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、善谷町、鳥居本町、本庄町、佐和山、彦根城					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等	
アカバナ	メマツヨイグサ		<i>Oenothera biennis</i>	大藪町、清崎町、甲田町、笹尾町、薩摩町、新海町、中山町、長曾根町、古沢町、本庄町、松原町、宮田町、犬上川、湖岸					帰化	
	モモイロヒルザキツキミノソウ		<i>Oenothera speciosa var. childsii</i>	三津屋町					帰化	
	ユウゲショウ		<i>Oenothera rosea</i>	後三条町					帰化	
アリトウグサ	オオフサモ		<i>Myriophyllum brasiliense</i>	石寺町、金亀町、新海町、八坂町、松原町、犬上川、平田川、湖岸、野田沼、彦根城					帰化	
	ホザキノフサモ		<i>Myriophyllum spicatum</i>	石寺町、船町、三津屋町、宇管川、琵琶湖、旧彦根港					帰化	
ウリノキ	ウリノキ		<i>Alangium platanifolium var. trilobum</i>	男鬼町、仏生寺町						
ミズキ	アオキ		<i>Aucuba japonica</i>	大堀町、金亀町、正法寺町、古沢町、犬上川、佐和山、彦根城						
	クマノミズキ		<i>Cornus macrophylla</i>	宇尾町、金亀町、正法寺町、芹川町、立花町、鳥居本町、古沢町、松原町、犬上川、芹川、雨壺山、佐和山、彦根城						
	ハナイカダ		<i>Helwingia japonica</i>	男鬼町、笹尾町、荘厳寺町						
	ヒメアオキ		<i>Aucuba japonica var. borealis</i>	男鬼町						
	ミズキ		<i>Cornus controversa</i>	男鬼町						
	ヤマボウシ		<i>Benthamidia japonica</i>	男鬼町、仏生寺町、武奈町						
ウコギ	ウド		<i>Aralia cordata</i>	稲里町、男鬼町、笹尾町、佐和山町、田附町、愛知川、荒神山、佐和山						
	カクレミノ		<i>Dendropanax trifidus</i>	金亀町、古沢町、雨壺山、荒神山、彦根城						
	キツタ		<i>Hedera rhombea</i>	大堀町、金亀町、城町、野瀬町、古沢町、元町、犬上川、佐和山、雨壺山、彦根城						
	コシアブラ		<i>Acanthopanax sciadophylloides</i>	男鬼町、笹尾町、原町						
	タカノツメ	イモノキ	<i>Evodiapanax innovans</i>	稲里町、大堀町、笹尾町、武奈町、古沢町、荒神山、佐和山						
	タラノキ		<i>Aralia elata</i>	金亀町、笹尾町、荒神山、彦根城						
	トチバニンジン		<i>Panax japonicus</i>	男鬼町						
	ハリギリ		<i>Kalopanax pictus</i>	男鬼町、金亀町、原町、彦根城						
	メダラ		<i>Aralia elata var. subinermis</i>	荒神山						
	ヤツデ		<i>Fatsia japonica</i>	大堀町、金亀町、彦根城						
	ヤマウコギ		<i>Acanthopanax spinosus</i>	男鬼町、原町、本庄町、犬上川、雨壺山						
	セリ	ウシミツバ		<i>Cryptotaenia japonica f. dissecta</i>	下稲葉町、愛知川、佐和山					
		ウマノミツバ		<i>Sanicula chinensis</i>	男鬼町、下稲葉町、仏生寺町、松原町、愛知川、佐和山					
オオチドメ			<i>Hydrocotyle ramiflora</i>	笹尾町、松原町						
オオバチドメ			<i>Hydrocotyle javanica</i>	笹尾町、下稲葉町、愛知川						
オオハナウド			<i>Heracleum dulce</i>			A	IV	E		
オヤブヅラミ			<i>Torilis scabra</i>	金亀町、立花町、長曾根町、日夏町、三津屋町、和田町、荒神山、曾根沼、彦根城						
シャク		コジャク	<i>Anthriscus sylvestris</i>	大堀町、開出今町、野田山町、犬上川、芹川、雨壺山						
セリ			<i>Oenanthe javanica</i>	宇尾町、大藪町、清崎町、金亀町、笹尾町、下稲葉町、芹川町、鳥居本町、野瀬町、平田町、松原町、和田町、犬上川、愛知川、芹川、彦根城						
セントウソウ			<i>Chamaele decumbens</i>	男鬼町、金亀町、荘厳寺町、善谷町、中央町、八坂町、原町、日夏町、仏生寺町、古沢町、本庄町、三津屋町、犬上川、雨壺山、荒神山、曾根沼、彦根城						
チドメグサ			<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i>	尾末町、金亀町、笹尾町、新海町、立花町、古沢町、佐和山、彦根城					史前帰化	
ツボクサ			<i>Centella asiatica</i>	稲里町、三津屋町、曾根沼						
ドクゼリ			<i>Cicuta virosa</i>	大藪町、尾末町、金亀町、新海町、八坂町、松原町、三津屋町、犬上川、曾根沼、彦根城、湖岸		C				

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
セリ	ドクニンジン		<i>Conium maculatum</i>	石寺町					帰化
	ヌマゼリ		<i>Sium suave var. nipponicum</i>		EN	A	I	B	
	ノチドメ		<i>Hydrocotyle maritima</i>	金亀町、笹尾町、立花町、古沢町、松原町、宮田町、佐和山、彦根城					
	ノラニンジン		<i>Daucus carota</i>	須越町					
	ヒメチドメ	ミヤマチドメ	<i>Hydrocotyle yabei</i>	三津屋町、曾根沼					
	マツバゼリ		<i>Apium leptophyllum</i>	立花町、松原町					帰化
	ミツバ		<i>Cryptotaenia japonica</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、八坂町、仏生寺町、古沢町、犬上川、彦根城					
	ムカゴニンジン		<i>Sium sisarum</i>					C	
	ヤブジラミ		<i>Torilis japonica</i>	大藪町、金亀町、荘厳寺町、新海町、立花町、鳥居本町、長曾根南町、八坂町、古沢町、松原町、三津屋町、犬上川、芹川、曾根沼					
ヤブニンジン		<i>Osmorhiza aristata</i>	金亀町、下稲葉町、荘厳寺町、鳥居本町、中山町、古沢町、本庄町、犬上川、愛知川、雨壺山、佐和山、彦根城						
イワウメ	オオイワカガミ		<i>Schizocodon soldanelloides var. magnus</i>	笹尾町、善谷町、鳥居本町、仏生寺町、荒神山					
リョウブ	リョウブ		<i>Clethra barbinervis</i>	稲里町、男鬼町、金亀町、笹尾町、野田山町、日夏町、山之脇町、雨壺山、彦根城					
イチヤクソウ	アキノギンリョウソウ	ギンリョウソウモドキ	<i>Monotropa uniflora</i>	雨壺山					
	イチヤクソウ		<i>Pyrola japonica</i>	笹尾町、鳥居本町、松原町、佐和山					
	ウメガサソウ		<i>Chimaphila japonica</i>				I	E	
ツツジ	アクシバ		<i>Vaccinium japonicum</i>	笹尾町、善谷町					
	アセビ		<i>Pieris japonica</i>	笹尾町					
	イワナシ		<i>Epigaea asiatica</i>	鳥居本町、荒神山					
	ウスギヨウラク		<i>Menziesia ciliolix</i>	笹尾町、野田山町、武奈町					
	ウスノキ	カクミノスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i>	笹尾町、正法寺町、原町、佐和山					
	オオハナヒリノキ		<i>Leucothoe grayana var. oblongifolia f. leiocarpa</i>	男鬼町、武奈町					
	カンサイスノキ		<i>Vaccinium smallii var. versicolor</i>	男鬼町、荒神山					
	コバノミツバツツジ		<i>Rhododendron reticulatum</i>	稲里町、笹尾町、善谷町、仏生寺町、荒神山					
	サツキ		<i>Rhododendron indicum</i>	金亀町、彦根城					
	シャシャンボ		<i>Vaccinium bracteatum</i>	大堀町、清崎町、金亀町、笹尾町、正法寺町、古沢町、雨壺山、佐和山、彦根城					
	スノキ		<i>Vaccinium smallii var. glabrum</i>	笹尾町、平田川					
	ナツハゼ		<i>Vaccinium oldhamii</i>	大堀町、笹尾町、正法寺町、荒神山					
	ネジキ		<i>Lyonia ovalifolia var. elliptica</i>	稲里町、大堀町、金亀町、笹尾町、正法寺町、野田山町、松原町、雨壺山、荒神山、彦根城					
	ハナヒリノキ		<i>Leucothoe grayana</i>	男鬼町、笹尾町、善谷町、鳥居本町、荒神山					
	ヒラドツツジ		<i>Rhododendron mucronatum</i>	金亀町、彦根城					
	ホツツジ		<i>Tripetaleia paniculata</i>	大堀町、笹尾町、善谷町、雨壺山、荒神山、佐和山					
	ミヤコツツジ		<i>Rhododendron × tectum</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、中山町、原町、彦根城					
	モチツツジ		<i>Rhododendron macrosepalum</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、原町、日夏町、雨壺山、彦根城					
	ヤマツツジ		<i>Rhododendron obtusum var. kaempferi</i>	男鬼町、笹尾町、武奈町					
	レンゲツツジ		<i>Rhododendron japonicum</i>	武奈町					
ヤブコウジ	カラタチバナ		<i>Ardisia crispa</i>					D	
	マンリョウ		<i>Ardisia crenata</i>	金亀町、宮田町、彦根城					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ヤブコウジ	ヤブコウジ		<i>Ardisia japonica</i>	稲里町、大堀町、小野町、金亀町、笹尾町、里根町、佐和山町、荘厳寺町、鳥居本町、佐和山、彦根城					
サクランソウ	オカトラノオ		<i>Lysimachia clethroides</i>	男鬼町、笹尾町					
	コナスビ		<i>Lysimachia japonica f. subsessilis</i>	男鬼町、後三条町、金亀町、笹尾町、立花町、古沢町、三津屋町、宮田町、芹川、曾根沼、彦根城					
	ナガエコナスビ		<i>Lysimachia japonica</i>	大堀町、男鬼町、清崎町、金亀町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町、原町、山之脇町、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	ヌマトラノオ		<i>Lysimachia fortunei</i>	笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、三津屋町、佐和山、曾根沼					
	ミヤマタゴボウ	ギンレイカ	<i>Lysimachia acroadenia</i>	武奈町					
	ヤナギトラノオ		<i>Lysimachia thyriflora</i>			B	V	C	
カキノキ	カキノキ		<i>Diospyros kaki</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、彦根城					
	リュウキュウマメガキ		<i>Diospyros japonica</i>	大堀町、芹川					
エゴノキ	エゴノキ		<i>Styrax japonicus</i>	石寺町、大堀町、笹尾町、新町、三津屋町、和田町、荒神山、佐和山、曾根沼					
	タナサワフタギ		<i>Symplocos coreana</i>	男鬼町、笹尾町、原町、武奈町					
モクセイ	イボタノキ		<i>Ligustrum obtusifolium</i>	稲部町、大堀町、笹尾町、野田山町、原町、日夏町、仏生寺町、古沢町、松原町、元町、和田町、矢倉川、雨壺山					
	コバトネリコ	アオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa f. serrata</i>	笹尾町					
	セイヨウイボタ		<i>Ligustrum vulgare</i>	尾末町、金亀町、薩摩町、彦根城					帰化
	セツツイボタ		<i>Ligustrum obtusifolium f. leiocalyx</i>	原町、仏生寺町					
	トウネズミモチ		<i>Ligustrum lucidum</i>	金亀町、佐和山町、松原町、彦根城					帰化
	ネズミモチ		<i>Ligustrum japonicum</i>	池州町、大堀町、尾末町、後三条町、金亀町、笹尾町、芹川町、野田山町、古沢町、松原町、元町、芹川、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ヒイラギ		<i>Osmanthus heterophyllus</i>	大堀町、金亀町、彦根城					
	ビロドイボタ		<i>Ligustrum obtusifolium</i>	笹尾町					
	マルバアオダモ		<i>Fraxinus sieboldiana</i>	男鬼町、笹尾町					
	ヤマトアオダモ		<i>Fraxinus longicuspis</i>	男鬼町、野田山町					
	ライラック	ムラサキハシドイ	<i>Syringa vulgaris</i>	野田山町					植栽
リンドウ	アケボノソウ		<i>Swertia bimaculata</i>	笹尾町					
	センブリ		<i>Swertia japonica</i>	清崎町、笹尾町、荒神山					
	ツルリンドウ		<i>Tripterospermum japonicum</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、中山町、日夏町、荒神山、佐和山、彦根城					
	ハナハマセンブリ		<i>Centaureum tenniflorum</i>	松原町					帰化
	リンドウ		<i>Gentiana scabra var. buergeri</i>	笹尾町、荘厳寺町、佐和山					
キョウチクトウ	キョウチクトウ		<i>Nerium indicum</i>	池州町、後三条町、金亀町、芹川					植栽
	ツルニチニチソウ		<i>Vinca major</i>	清崎町、善谷町、長曾根町、長曾根南町、野瀬町、東沼波町、仏生寺町、湖岸					帰化
	テイカズラ		<i>Trachelospermum asiaticum</i>	金亀町、仏生寺町、彦根城					
ガガイモ	アズマカモメヅル		<i>Cynanchum sublaeolatum f. albiflorum</i>			C	III	D	
	オオカモメヅル		<i>Tylophora aristolochioides</i>	男鬼町、佐和山町、荘厳寺町					
	ガガイモ		<i>Metaplexis japonica</i>	大堀町、薩摩町、長曾根町、八坂町、日夏町、松原町、犬上川、芹川、野田沼、湖岸					
	コバノカモメヅル		<i>Cynanchum sublaeolatum</i>	笹尾町、三津屋町、曾根沼		C			
アカネ	アカネ		<i>Rubia argyi</i>	男鬼町、金亀町、正法寺町、野瀬町、古沢町、三津屋町、柳川町、佐和山、曾根沼、彦根城					
	オオハシカグサ		<i>Hedyotis lindleyana var. glabra</i>	金亀町、仏生寺町、三津屋町、彦根城、曾根沼					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
アカネ	オオバノヤエムグラ		<i>Galium pseudo-asprellum</i>	仏生寺町					
	オククルマムグラ		<i>Galium trifloriforme</i>	仏生寺町、佐和山					
	カワラマツバ		<i>Galium verum var. asiaticum f. nikkoense</i>	男鬼町、広野町、後三条町、新海町、日夏町、松原町、犬上川、芹川					
	キクムグラ		<i>Galium kikumugura</i>	石寺町、男鬼町、尾末町、小野町、清崎町、金亀町、佐和山町、鳥居本町、原町、武奈町、古沢町、荒神山、彦根城、佐和山					
	クルマムグラ		<i>Galium trifloriforme var. nipponicum</i>	男鬼町、荘厳寺町、鳥居本町、仏生寺町					
	チョウセンカワラマツバ		<i>Galium verum var. trachycarpum f. album</i>	薩摩町、新海町、日夏町					
	ツルアリドオシ		<i>Mitchella undulata</i>	石寺町、男鬼町、金亀町、笹尾町、鳥居本町、荒神山、佐和山、彦根城					
	トゲナシヤエムグラ		<i>Galium spurium var. spurium</i>	松原町					帰化
	ハシカグサ		<i>Hedyotis lindleyana var. hirsuta</i>	男鬼町、小野町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、仏生寺町、古沢町、三津屋町、宮田町、曾根沼、彦根城、佐和山					
	ハナヤエムグラ		<i>Sherardia arvensis</i>	日夏町、蓮台寺町					帰化
	ヒメヨツバムグラ		<i>Galium gracilens</i>	金亀町、三津屋町、曾根沼、彦根城					
	フタバムグラ		<i>Hedyotis diffusa</i>	男鬼町、小野町、清崎町、笹尾町、佐和山町、新海町、出路町、鳥居本町、八坂町、肥田町、松原町、宮田町、愛知川、佐和山					
	ヘクソカズラ	ヤイトバナ	<i>Paederia scandens</i>	男鬼町、清崎町、金亀町、笹尾町、長曾根町、野瀬町、八坂町、古沢町、本町、松原町、宮田町、芹川、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ホソバノヨツバムグラ		<i>Galium trifidum var. brevipedunculatum</i>	大藪町、芹川町、中山町、松原町、三津屋町、曾根沼					
	ヤエムグラ		<i>Galium spurium var. echinospermon</i>	男鬼町、金亀町、中藪、長曾根町、野瀬町、八坂町、日夏町、古沢町、三津屋町、犬上川、芹川、曾根沼、佐和山、彦根城					史前帰化
ヤマムグラ		<i>Galium pogananthum</i>	小野町、古沢町						
ヨツバムグラ		<i>Galium trachyspermum</i>	清崎町、金亀町、笹尾町、須越町、野田山町、原町、三津屋町、曾根沼、野田沼、佐和山、彦根城						
ヒルガオ	アサガオ		<i>Ipomoea nil</i>	新海町、芹川町、雨壺山					帰化
	アメリカアサガオ		<i>Ipomoea hederacea</i>	馬場					帰化
	アメリカネナシカズラ		<i>Cuscuta campestris</i>	石寺町、清崎町、笹尾町、新海町、中山町、野田山町、八坂町、松原町、宮田町、柳川町、犬上川、野田沼、湖岸					帰化
	コヒルガオ		<i>Calystegia hederacea</i>	大藪町、尾末町、河原、清崎町、新海町、芹川町、長曾根南町、平田町、松原町、宮田町、和田町、犬上川、芹川、平田川					
	ネナシカズラ		<i>Cuscuta japonica</i>	中山町					
	ハマヒルガオ		<i>Calystegia soldanella</i>	薩摩町、新海町、長曾根町、八坂町、松原町、犬上川、芹川、雨壺山、湖岸					
	ヒルガオ		<i>Calystegia japonica</i>	大藪町、金亀町、長曾根町、東沼波町、南三ツ谷町、彦根城、湖岸					
	マメアサガオ		<i>Ipomoea launosa</i>	尾末町、開出今町、清崎町、銀座町、八坂町、松原町、犬上川、野田沼					帰化
	マルバアサガオ		<i>Ipomoea purpurea</i>	新海町、松原町					帰化
	マルバルコウソウ		<i>Ipomoea coccinea</i>	金亀町、薩摩町、芹川町、日夏町、古沢町、松原町、宮田町					帰化
	ルコウソウ		<i>Ipomoea quamouquit</i>	大藪町、新海町					帰化
ムラサキ	オニルリソウ		<i>Cynoglossum asperimum</i>	男鬼町、武奈町					
	キュウリグサ		<i>Trigonotis peduncularis</i>	大藪町、開出今町、清崎町、金亀町、下稲葉町、新海町、須越町、芹橋、中央町、中藪、野瀬町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、宮田町、元町、愛知川、芹川、野田沼、彦根城					史前帰化
	ノハラムラサキ		<i>Myosotis arvensis</i>	大藪町、須越町、芹川、野田沼					帰化

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ムラサキ	ハナイバナ		Bothriospermum tenellum	大藪町、小野町、笹尾町、薩摩町、中藪、八坂町、原町、平田町、本庄町、松原町、雨壺山					
	ハマウスレナグサ		Myosotis discolor	新海町					帰化
	ヒレハリソウ	コンフリー	Symphytum officinale	岡町、小泉町、芹川町、芹橋、和田町					帰化
	ホタルカズラ		Buglossoides zollingeri	男鬼町、仏生寺町、武奈町					
	ミズタバコ		Trigonotis brevipes	鳥居本町、原町					
	ウスレナグサ		Myosotis scorpioides	金亀町					帰化
クマツヅラ	アレチハナガサ		Verbena brasiliensis	大藪町、薩摩町、新海町、田附町、鳥居本町、長曾根町、野田山町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、荒神山、愛知川					帰化
	カリガネソウ		Caryopteris divaricata					C	
	クサギ		Clerodendrum trichotomum	京町、金亀町、笹尾町、新町、古沢町、松原町、宮田町、和田町、矢倉川、雨壺山、荒神山、彦根城					
	コムラサキ		Callicarpa dichotoma			C	VI	B	
	ダキバアレチハナガサ		Verbena incompta	新海町					帰化
	バーベナ		Verbena hybrids	松原町					
	ハマゴウ		Vitex rotundifolia				II	D	
	ビロードクサギ		Clerodendron trichotomum f. ferrugineum	男鬼町、笹尾町、仏生寺町					
	ムラサキシキブ		Callicarpa japonica	大堀町、男鬼町、金亀町、笹尾町、古沢町、雨壺山、彦根城					
	ヤナギハナガサ		Verbena bonariensis	石寺町、大堀町、尾末町、清崎町、広野町、里根町、新海町、八坂町、東沼波町、日夏町、古沢町、松原町、蓮台寺町、和田町、犬上川、芹川、雨壺山					帰化
ヤブムラサキ		Callicarpa mollis	金亀町、彦根城						
アワゴケ	アワゴケ		Callitriche japonica	金亀町、立花町、彦根城					
シソ	アオジソ		Perilla frutescens var. acuta f. viridis	笹尾町					
	アキチヨウジ		Rabdosia longituba	男鬼町、仏生寺町、本庄町					
	アキノタムラソウ		Salvia japonica	男鬼町、金亀町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町、古沢町、宮田町、荒神山、佐和山、彦根城					
	イヌコウジュ		Mosla punctulata	男鬼町、尾末町、清崎町、金亀町、笹尾町、田附町、鳥居本町、三津屋町、山之脇町、雨壺山、曾根沼、彦根城					
	イヌゴマ		Stachys riederi var. intermedia	大藪町、金亀町、新海町、長曾根町、八坂町、平田町、松原町、三津屋町、宮田町、犬上川、芹川、曾根沼、湖岸					
	イストウバナ		Clinopodium micranthum	男鬼町、笹尾町、本庄町、愛知川、佐和山					
	ウツボグサ		Prunella vulgaris ssp. asiatica	笹尾町、佐和山					
	エゴマ		Perilla frutescens	開出今町					
	オカタツナミソウ		Scutellaria brachyspica	男鬼町、清崎町、荘厳寺町、鳥居本町、野田山町、荒神山、佐和山					
	オドリコソウ		Lamium barbatum	大堀町、男鬼町、日夏町、芹川、荒神山					
	オランダハッカ		Mentha viridis var. crispa	大藪町、清崎町、外町、長曾根南町、八坂町、古沢町、松原町、芹川、平田川					帰化
	カキドオシ		Glechoma hederacea var. grandis	清崎町、金亀町、笹尾町、中央町、仏生寺町、古沢町、宮田町、犬上川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	キラソウ		Ajuga decumbens	金亀町、笹尾町、善谷町、古沢町、荒神山、佐和山、彦根城					
	クルマバナ		Clinopodium chinense var. parviflorum	大藪町、男鬼町、清崎町、笹尾町、佐和山					
	コショウハッカ		Mentha piperita	西今町					帰化
コシロネ		Lycopus ramosissimus var. japonicus	大藪町、笹尾町、須越町、鳥居本町、中山町、八坂町、三津屋町、曾根沼						

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
シソ	コバノタツナミ		Scutellaria indica var. parvifolia	清崎町、立花町					
	シソ		Perilla frutescens f. viridis	笹尾町					
	シラゲヒメジソ	ヒカゲヒメジソ	Mosla dianthera var. nana	笹尾町、田附町、中山町、荒神山					
	シロネ		Lycopus lucidus	新海町、長曾根町、八坂町、馬場、松原町、三津屋町、犬上川、芹川、曾根沼、野田沼、湖岸					
	セイヨウキランソウ	セイヨウジュウニヒトエ	Ajuga reptans	八坂町、日夏町、荒神山					帰化
	タツナミソウ		Scutellaria indica	中藪					
	ツルニガクサ		Teucrium viscidum var. miquelianum	男鬼町、金亀町、田附町、本庄町、彦根城、愛知川					
	テンニンソウ		Leucosceptrum japonicum	芹川					
	トウバナ		Clinopodium gracile	大堀町、男鬼町、金亀町、笹尾町、鳥居本町、中藪、日夏町、平田町、仏生寺町、本庄町、松原町、三津屋町、愛知川、荒神山、佐和山、曾根沼、彦根城					
	ナギナタコウジュ		Elythia ciliata	下稲葉町、愛知川、雨壺山、荒神山					
	ニガクサ		Teucrium japonicum	莊厳寺町、善谷町、古沢町、本庄町、芹川					
	ニシキゴロモ		Ajuga yezoensis	笹尾町、原町					
	ハッカ		Mentha arvensis var. piperascens	新海町、須越町、田附町、中藪、野田山町、八坂町、普光寺町、三津屋町、山之脇町、芹川、雨壺山、荒神山、曾根沼、野田沼					
	ハナトラノオ	カクトラノオ	Physostegia virginiana	笹尾町					帰化
	ヒメオドリコソウ		Lamium purpureum	金亀町、笹尾町、中山町、野瀬町、古沢町、松原町、芹川、平田川					帰化
	ヒメサルダヒコ		Lycopus ramosissimus	小野町、野田山町、松原町、三津屋町、曾根沼					
	ヒメジソ		Mosla dianthera	大藪町、小野町、金亀町、笹尾町、薩摩町、鳥居本町、中山町、野瀬町、野田山町、松原町、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	ヒメシロネ		Lycopus maackianus	小野町、笹尾町、田附町、鳥居本町					
	ヒメナミキ		Scutellaria dependens			C	VI	C	
	ホトケノザ		Lamium amplexicaule	清崎町、金亀町、薩摩町、須越町、戸賀町、野瀬町、八坂町、日夏町、平田町、松原町、宮田町、芹川、野田沼					史前帰化
	ホナガタツナミソウ		Scutellaria maekawae	笹尾町、野田山町					
	ミカエリソウ		Leucosceptrum stellipilum	男鬼町					
	ミズネコノオ		Eustellaris stellata		VU	準	II	D	
	ミゾコウジュ		Salvia plebeia		NT	C	II	C	
	メグサハッカ		Mentha pulegium	芹町					帰化
	メハジキ		Leonurus japonicus	男鬼町、新海町、芹橋、芹川、湖岸					
ヤマクマバナ		Clinopodium chinense var. shibetchense	大堀町、笹尾町、東沼波町、武奈町、芹川、荒神山						
ヤマハッカ		Rabdosia inflexa	金亀町、古沢町、佐和山、彦根城						
ラショウモンカズラ		Meehania urticifolia	犬上川						
レモンエゴマ		Perilla frutescens var. citriodora	尾末町、金亀町、莊厳寺町、善谷町、鳥居本町、彦根城、雨壺山						
ナス	アメリカイヌホオズキ		Solanum americanum	石寺町、小野町、清崎町、笹尾町、佐和山町、地蔵町、新海町、田附町、鳥居本町、中山町、長曾根町、東沼波町、本庄町、松原町、宮田町、愛知川、芹川、佐和山					帰化
	イヌホオズキ		Solanum nigrum	石寺町、閉出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、薩摩町、新海町、田附町、東沼波町、日夏町、古沢町、本庄町、松原町、和田町、犬上川、愛知川、雨壺山、彦根城					史前帰化
	オオイヌホオズキ		Solanum nigrescens	新海町					帰化

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ナス	オオセンナリ		<i>Nicandra physaloides</i>	中山町					帰化
	オオマルバノホロシ		<i>Solanum megacarpum</i>			C	VI	D	
	クコ		<i>Lycium chinense</i>	大藪町、河原、薩摩町、新海町、長曾根町、松原町、愛知川、芹川、湖岸					帰化
	テリミノイヌホオズキ		<i>Solanum americanum</i>	男鬼町、後三条町、薩摩町、日夏町、仏生寺町、本庄町、荒神山					帰化
	ハダカホオズキ		<i>Tubocapsicum anomalum</i>	男鬼町、古沢町、本庄町、佐和山					
	ヒヨドリジョウゴ		<i>Solanum lyratum</i>	金亀町、笹尾町、正法寺町、立花町、肥田町、平田町、三津屋町、和田町、雨壺山、荒神山、佐和山、曾根沼、彦根城					
	ホオズキ		<i>Physalis alkekengi var. franchetii</i>	宇尾町、犬上川					帰化
	ヤマホロシ		<i>Solanum japonense</i>	男鬼町、仏生寺町					
	ヨウシュチョウセンアサガオ		<i>Datura stramonium</i>	石寺町、鳥居本町					帰化
	ワルナスビ		<i>Solanum carolinense</i>	尾末町、金亀町、新海町、日夏町、元町、犬上川、平田川					帰化
ゴマノハグサ	アゼトウガラシ		<i>Lindernia micrantha</i>	石寺町、小野町、笹尾町、薩摩町、荘厳寺町、田附町、鳥居本町、中山町、八坂町、肥田町、松原町、三津屋町、宮田町、佐和山					史前帰化
	アゼナ		<i>Lindernia procumbens</i>	大藪町、小野町、清崎町、甲崎町、甲田町、笹尾町、薩摩町、須越町、田附町、長曾根南町、中藪、肥田町、日夏町、普光寺町、松原町、南三ツ谷町、芹川、平田川					史前帰化
	アブノメ		<i>Dopatrium junceum</i>					D	
	アメリカアゼナ		<i>Lindernia dubia</i>	大藪町、小野町、清崎町、甲崎町、笹尾町、須越町、芹川町、立花町、中藪、野瀬町、八坂町、普光寺町、松原町、三津屋町、佐和山					帰化
	アレチモウズイカ		<i>Verbascum virgatum</i>	新海浜					帰化
	イヌノフグリ		<i>Veronica polita var. lilacina</i>		VU	準	IV	B	
	ウリクサ		<i>Lindernia crustacea</i>	立花町、田附町、三津屋町、荒神山、曾根沼					史前帰化
	エダウチズズメトウガラシ		<i>Lindernia antipoda var. grandiflora</i>	石寺町、小野町、笹尾町、荘厳寺町、田附町、鳥居本町、中山町、肥田町、普光寺町、仏生寺町、松原町、三津屋町、曾根沼					
	オオイヌノフグリ		<i>Veronica persica</i>	大堀町、金亀町、笹尾町、中央町、戸賀町、鳥居本町、長曾根町、中藪、野瀬町、八坂町、日夏町、古沢町、宮田町、芹川、佐和山、野田沼、彦根城					帰化
	カワチシャ		<i>Veronica undulata</i>	池州町、大堀町、広野町、芹川町、中藪、八坂町、東沼波町、松原町、安清東町、犬上川、芹川、佐和山	NT	準			
	キクモ		<i>Limnophila sessiliflora</i>	大藪町、小野町、笹尾町、薩摩町、佐和山町、鳥居本町、中山町、野瀬町、肥田町、古沢町、松原町、佐和山					史前帰化
	キリ		<i>Paulownia tomentosa</i>	野田山町					帰化？
	クチナシグサ		<i>Monochasma sheareri</i>				V	C	
	コシオガマ		<i>Phtheirospermum japonicum</i>				III	B	
	サウトウガラシ		<i>Deinostema violaceum</i>	笹尾町、松原町					
	シコクママコナ		<i>Melampyrum laxum</i>	仏生寺町					
	シソクサ		<i>Limnophila chinensis ssp. aromatica</i>	石寺町、笹尾町、薩摩町、新海町、肥田町、普光寺町、松原町、三津屋町、宮田町、柳川町、佐和山、曾根沼		C	VI		
	タケトアゼナ		<i>Lindernia dubia ssp. typica</i>	大藪町、開出今町、清崎町、長曾根南町、松原町、三津屋町、芹川、平田川					帰化
	タチイヌノフグリ		<i>Veronica arvensis</i>	金亀町、下稲葉町、立花町、中藪、八坂町、日夏町、松原町、元町、愛知川、平田川、彦根城					帰化
	ツタバウンラン		<i>Cybararia muralis</i>	芹橋、芹町、鳥居本町、松原町					帰化

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ゴマノハグサ	トキワハゼ		Mazus pumilus	大藪町、清崎町、金亀町、薩摩町、芹川町、立花町、中央町、出路町、鳥居本町、中藪、野瀬町、日夏町、平田町、松原町、宮田町、元町、彦根城					
	ヒメキンギョソウ		Linaria maroccana	愛知川					帰化
	ピロードモウズイカ		Verbascum thapsus	大藪町、広野町、新海浜、長曾根南町、平田町、犬上川					帰化
	ヒロハスズメトウガラシ	スズメトウガラシ	Lindernia antipoda var. verbenaeifolia	小野町、笹尾町、松原町、宮田町					
	フラサバソウ		Veronica hederifolia	鳥居本町、中藪、八坂町、東沼波町、犬上川、芹川					帰化
	マツバウンラン		Linaria canadensis	尾末町、清崎町、小泉町、金亀町、城町、新海町、竹ヶ鼻町、八坂町、日夏町、柳川町、湖岸					帰化
	ミゾホオズキ		Mimulus nepalensis	男鬼町、仏生寺町					
	ミヤマママコナ		Melampyrum laxum var. nikkoense	仏生寺町、荒神山					
	ムシクサ		Veronica peregrina	尾末町、金亀町、立花町、中藪、本庄町、松原町、愛知川、彦根城					史前帰化
	ムラサキサギゴケ		Mazus miquelii	小野町、笹尾町、中藪、野瀬町、本庄町、三津屋町、宮田町、佐和山、曾根沼					
モウズイカ		Verbascum blattaria	新海浜					帰化	
ノウゼンカズラ	ノウゼンカズラ		Campsis chinensis	京町					
キツネノマゴ	オギノツメ		Hygrophila salicifolia				II	C	
	キササゲ		Catalpa ovata	戸賀町					植栽
	キツネノマゴ		Justicia procumbens	尾末町、金亀町、笹尾町、佐和山町、田附町、八坂町、仏生寺町、古沢町、松原町、和田町、犬上川、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ハグロソウ		Peristrophe japonica var. subrotunda	男鬼町、佐和山町、新町、鳥居本町、和田町、佐和山					
タヌキモ	イヌタヌキモ		Utricularia tenuicaulis			III	D		
ハエドクソウ	ナガバハエドクソウ		Phryma leptostachys var. asiatica f. oblongifolia	大堀町、男鬼町、金亀町、荘厳寺町、田附町、日夏町、古沢町、荒神山、佐和山、彦根城					
オオバコ	オオバコ		Plantago asiatica	男鬼町、尾末町、金亀町、笹尾町、芹川町、鳥居本町、古沢町、松原町、三津屋町、曾根沼、彦根城、雨壺山					史前帰化
	ツボミオオバコ		Plantago virginica	新海町、八坂町、古沢町、本庄町、三津屋町、曾根沼、愛知川					帰化
	ヘラオオバコ		Plantago lanceolata	清崎町、新海町、八坂町、平田町、松原町、野田沼					帰化
スイカズラ	ウグイスカグラ		Lonicera gracilipes var. glabra	笹尾町、鳥居本町					
	ウツギ		Deutzia crenata	男鬼町					
	オオカメノキ		Viburnum furcatum	笹尾町					
	オトコヨウゾメ		Viburnum phlebotrictim	男鬼町					
	ガマズミ		Viburnum dilatatum	石寺町、大堀町、笹尾町、荘厳寺町、田附町、仏生寺町、本庄町、松原町、三津屋町、愛知川、矢倉川、荒神山、曾根沼					
	ケナシヤブデマリ		Viburnum plicatum f. glabrum	男鬼町					
	コバノガマズミ		Viburnum erosum var. punctatum	大堀町、男鬼町、小野町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、中山町、原町、仏生寺町、武奈町、雨壺山、荒神山、佐和山					
	ゴマギ		Viburnum sieboldii	大堀町、男鬼町、本庄町					
	サンゴジュ		Viburnum odoratissimum var. awabuki	金亀町、彦根城					植栽
	スイカズラ		Lonicera japonica	大堀町、尾末町、金亀町、笹尾町、新海町、善谷町、長曾根町、八坂町、日夏町、武奈町、古沢町、三津屋町、宮田町、和田町、雨壺山、荒神山、佐和山、曾根沼、彦根城					
	ソクズ		Sambucus chinensis	宇尾町、男鬼町、金亀町、笹尾町、田附町、鳥居本町、八坂町、東沼波町、本庄町、松原町、犬上川、愛知川、芹川、雨壺山、彦根城					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
スイカズラ	タニウツギ		Weigela hortensis	男鬼町、笹尾町、武奈町					
	ツクバネウツギ		Abelia spathulata	稲里町、男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、中山町、野田山町、原町、宮田町、佐和山					
	テリハコバノガマズミ		Viburnum erosum	中山町					
	ニワトコ		Sambucus racemosa ssp. sieboldiana	男鬼町、金亀町、野田山町、佐和山、彦根城					
	ハコネウツギ		Weigela coraeensis	荒神山、野田沼					植栽
	ハナゾノツクバネウツギ	アベリア	Abelia × grandiflora	大藪町					逸出・植栽
	ミヤマガマズミ		Viburnum wrightii	笹尾町、原町、武奈町					
	ヤブデマリ		Viburnum plicatum var. tomentosum	男鬼町、笹尾町、仏生寺町、武奈町					
	ヤマウグイスカグラ		Lonicera gracilipes	大堀町、男鬼町、笹尾町、佐和山町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、野田山町、原町、佐和山					
レンブクソウ	レンブクソウ		Adoxa moschatellina					D	
オミナエシ	オトコエシ		Patrinia villosa	男鬼町、小野町、善谷町、鳥居本町、長曾根町、仏生寺町、古沢町、湖岸					
	オミナエシ		Patrinia scabiosaefolia					D	
	セイヨウカノコソウ		Valeriana officinalis	柳川町、湖岸					帰化
	ツルカノコソウ		Valeriana flaccidissima	男鬼町、本庄町、宮田町、愛知川、佐和山					
	ノヂシヤ		Valerianella oltoria	本庄町、松原町、柳川町、愛知川、芹川、湖岸					
キキョウ	アゼムシロ	ミゾカクシ	Lobelia chinensis	大藪町、小野町、清崎町、金亀町、笹尾町、薩摩町、芹川町、野瀬町、日夏町、平田町、本町、松原町					
	キキョウソウ		Specularia perfoliata	池州町、新海町、中藪、八坂町、元町、佐和山					帰化
	サワギキョウ		Lobelia sessilifolia					C	
	タニギキョウ		Peracarpa carnosus var. circaeoides	笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、古沢町、本庄町、芹川、雨壺山、荒神山、佐和山					
	ツリガネニンジン		Adenophora triphylla var. japonica	小野町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、中山町、日夏町、松原町、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					
	ツルニンジン		Codonopsis lanceolata	日夏町、荒神山、佐和山					
	ヒナギキョウ		Wahlenbergia marginata	金亀町、新海町、八坂町、松原町					帰化
	ホタルブクロ		Campanula punctata	男鬼町、広野町、笹尾町、善谷町、仏生寺町、犬上川					
キク	アイノコセンダングサ		Bidens pilosa var. intermedia	八坂町、松原町、犬上川					
	アカミタンポポ		Taraxacum laevigatum	大堀町、金亀町、西今町、松原町、彦根城					帰化
	アキノキリンソウ		Solidago virgaurea var. asiatica	稲里町、大堀町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、荒神山、佐和山、彦根城					
	アキノノゲシ		Lactuca indica	開出今町、小泉町、金亀町、笹尾町、芹橋、芹町、鳥居本町、長曾根町、八坂町、日夏町、松原町、宮田町、犬上川、芹川、平田川、雨壺山、彦根城					史前帰化
	アメリカセンダングサ		Bidens frondosa	男鬼町、開出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、薩摩町、荘厳寺町、長曾根町、八坂町、日夏町、本町、松原町、三津屋町、和田町、宇管川、平田川、曾根沼、彦根城					帰化
	アメリカカタサブロウ		Eclipta alba	大藪町、清崎町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、長曾根南町、野瀬町、松原町、三津屋町、宮田町、和田町、宇管川、平田川、曾根沼、野田沼、彦根城					帰化
	アラゲハンゴンソウ		Rudbeckia hirta var. pulcherrima	新海町、愛知川					帰化
	アレチノギク		Conyza bonariensis	京町、金亀町、佐和町、須越町、長曾根町、八坂町、原町、三津屋町、平田川、雨壺山					帰化
	イナカギク		Aster ageratoides ssp. amplexifolius	男鬼町、小野町、笹尾町、雨壺山、佐和山					
	イワニガナ	ジシバリ	Ixeris stolonifera	小野町、日夏町、荒神山					
	イワヨモギ		Artemisia iwayomogi	石寺町、男鬼町、須越町、仏生寺町		VU			帰化
	ウスイロノゲシ		Sonchus oleraceus f. lilacina	三津屋町、曾根沼					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
キク	ウスベニチチコグサ		<i>Gnaphalium purpureum</i>	稲部町、大藪町、薩摩町、城町、新海町、鳥居本町、八坂町、日夏町、松原町、三津屋町、曾根沼					帰化
	ウラジロチチコグサ		<i>Gnaphalium spicatum</i>	金亀町、新海町、鳥居本町、日夏町、三津屋町、曾根沼、彦根城					帰化
	オオアレチノギク		<i>Conyza sumatrensis</i>	大藪町、男鬼町、開出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、須越町、中藪町、長曾根町、本町、芹川、彦根城					帰化
	オオオナモミ		<i>Xanthium occidentale</i>	大藪町、長曾根町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、蓮台寺町、犬上川、平田川、荒神山、佐和山					帰化
	オオキンケイギク		<i>Coreopsis lanceolata</i>	大堀町、芹川					帰化
	オオジシバリ		<i>Ixeris debilis</i>	金亀町、笹尾町、薩摩町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、芹川、彦根城					
	オオバナニガナ		<i>Ixeris dentata var. albiflora f. amplitolia</i>	新海町					
	オグルマ		<i>Inula japonica</i>	大藪町、清崎町、金亀町、下稲葉町、須越町、鳥居本町、長曾根南町、野田山町、八坂町、平田町、普光寺町、古沢町、松原町、三津屋町、安清東町、野田沼		C	VI		
	オトコヨモギ		<i>Artemisia japonica</i>	男鬼町					
	オニタビラコ		<i>Youngia japonica</i>	尾末町、清崎町、後三条町、金亀町、薩摩町、下稲葉町、日夏町、古沢町、本町、三津屋町、和田町、愛知川、芹川、佐和山、曾根沼、彦根城					
	オノノゲシ		<i>Sonchus asper</i>	大藪町、開出今町、清崎町、金亀町、新海町、長曾根町、日夏町、本町、松原町、三津屋町、宮田町、平田川、荒神山、曾根沼、彦根城					帰化
	カシワバハグマ		<i>Pertya robusta</i>	男鬼町、武奈町					
	カミツレ		<i>Matricaria chamomilla</i>	立花町					
	カワラハハコ		<i>Anaphalis margaritacea ssp. yedoensis</i>	薩摩町、湖岸		B			
	カワラヨモギ		<i>Artemisia capillaris</i>	男鬼町、新海町、八坂町、東沼波町、本庄町、三津屋町、犬上川、芹川					
	ガンクビソウ		<i>Carpesium divaricatum</i>	男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、日夏町、仏生寺町、雨壺山、荒神山、佐和山					
	カンサイタンポポ		<i>Taraxacum japonicum</i>	中央町、古沢町、本庄町、宮田町、愛知川、佐和山					
	ククイモ		<i>Helianthus tuberosus</i>	金亀町、新海町、長曾根町、本庄町、松原町、彦根城					帰化
	キセルアザミ	マアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i>	小野町、笹尾町、荘厳寺町、中山町、宮田町、佐和山					
	キッコウハグマ		<i>Ainsliaea apiculata</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、長曾根南町、荒神山、佐和山、彦根城					
	キツネアザミ		<i>Hemistepta lyrata</i>	鳥居本町、八坂町、仏生寺町					史前帰化
	キバナコスモス		<i>Cosmos sulphureus</i>	石寺町、新海町、三津屋町、曾根沼、愛知川					帰化
	ケナシヒメムカシヨモギ		<i>Erigeron pusillus</i>	薩摩町、馬場					帰化
	コウゾリナ		<i>Picris hieracioides var. glabrescens</i>	男鬼町、笹尾町、薩摩町、本庄町					
	コウヤボウキ		<i>Pertya scandens</i>	清崎町、笹尾町、古沢町、雨壺山、荒神山、佐和山					
	コオニタビラコ		<i>Lapsana apogonoidea</i>	芹川町、鳥居本町、西今町、平田町、古沢町、山之脇町					
	コギク		<i>Chrysanthemum morifolium</i>	金亀町、彦根城					植栽
	コシロノセンダングサ	シロバナセンダングサ	<i>Bidens pilosa var. minor</i>	開出今町、河原、金亀町、田附町、鳥居本町、古沢町、本庄町、松原町、安清町、愛知川、芹川、荒神山、彦根城					帰化
	コセンダングサ		<i>Bidens pilosa</i>	大藪町、金亀町、薩摩町、新海町、田附町、松原町、安清町、愛知川、荒神山、佐和山、彦根城					帰化
	コメナモミ		<i>Siegesbeckia orientalis ssp. glabrescens</i>	笹尾町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、日夏町、荒神山					史前帰化
	コヤブタバコ		<i>Carpesium cernuum</i>					D	
	サジガンクビソウ		<i>Carpesium glossophyllum</i>	大堀町、男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、雨壺山、荒神山					
サワギク	ボロギク	<i>Senecio nikoensis</i>	男鬼町、鳥居本町、武奈町、佐和山						
サワヒヨドリ		<i>Eupatorium lindleyanum</i>	笹尾町、佐和山町						
シュウブソウ		<i>Rhynchospermum verticillatum</i>	男鬼町、本庄町、愛知川						

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
キク	シラヤマギク		<i>Aster scaber</i>	笹尾町					
	シロタエヒマワリ		<i>Helianthus argophyllus</i>	清崎町					帰化
	シロバナタンポポ		<i>Taraxacum albidum</i>	金亀町、城町					
	シロバナニガナ		<i>Ixeris dentata var. albiflora</i>	石寺町、荒神山					
	シロヨメナ	ヤマシロギク	<i>Aster ageratoides ssp. leiophyllus</i>	荒神山、雨壺山					
	スイラン		<i>Holleion krameri</i>					B	
	スズカアザミ		<i>Cirsium suzukaense</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、正法寺町、善谷町、鳥居本町、仏生寺町、武奈町、古沢町、犬上川、雨壺山、佐和山、彦根城					
	セイトカアワダチソウ	セイトカアキノキリンソウ	<i>Solidago altissima</i>	尾末町、開出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、新町、芹川町、辻堂町、長曾根町、野瀬町、八坂町、日夏町、平田町、安清町、山之脇町、和田町、犬上川、芹川、平田川、雨壺山、彦根城、湖岸					帰化
	セイトカタンポポ		<i>Taraxacum elatum</i>	金亀町、笹尾町、本庄町、宮田町、愛知川、彦根城					
	セイヨウタンポポ		<i>Taraxacum officinale</i>	尾末町、開出今町、金亀町、西今町、日夏町、本庄町、愛知川、芹川、平田川、荒神山、彦根城					帰化
	セイヨウトゲアザミ		<i>Cirsium arvense</i>	八坂町					
	セイヨウノコギリソウ		<i>Achillea millefolium</i>	大堀町、新海町、馬場、本庄町、愛知川、芹川					帰化
	センダングサ		<i>Bidens biternata</i>	金亀町、薩摩町、新海町、田附町、長曾根南町、八坂町、古沢町、平田川、彦根城					帰化
	センボンヤリ	ムラサキタンポポ	<i>Leibnitzia anandria</i>	佐和山					
	タイムガサ		<i>Cacalia peltifolia</i>			準	V	B	
	タウコギ		<i>Bidens tripartita</i>					D	史前帰化
	タチチコグサ		<i>Gnaphalium calviceps</i>	新海町、鳥居本町、日夏町、安清東町					帰化
	タマバシロヨメナ		<i>Aster ageratoides ssp. leiophyllus var. ovalifoli</i>	荘厳寺町					
	タムラソウ		<i>Serratula coronata ssp. insularis</i>	仏生寺町					
	ダンドボロギク		<i>Erechtites hieracifolia</i>	小野町、笹尾町					帰化
	チチコグサ		<i>Gnaphalium japonicum</i>	尾末町、金亀町、新海町、芹川町、鳥居本町、日夏町、三津屋町、曾根沼、彦根城					
	チチコグサモドキ		<i>Gnaphalium pensylvanicum</i>	金亀町、佐和町、新海町、長曾根南町、八坂町、日夏町、三津屋町、彦根城、曾根沼					帰化
	チョウセンアザミ		<i>Cynara scolymus</i>	八坂町					帰化
	ツワブキ		<i>Farfugium japonicum</i>	金亀町、彦根城					
	トキンソウ		<i>Centipeda minima</i>	小野町、金亀町、笹尾町、薩摩町、立花町、鳥居本町、中敷、野瀬町、日夏町、平田町、松原町、宮田町、蓮台寺町、佐和山、彦根城					史前帰化
	トゲチシャ		<i>Lactuca scariola</i>	石寺町、大藪町、男鬼町、清崎町、中敷、八坂町、芹川					帰化
	ニガナ		<i>Ixeris dentata</i>	男鬼町、小野町、清崎町、笹尾町、薩摩町、八坂町、日夏町、古沢町、三津屋町、宮田町、荒神山、佐和山、曾根沼					
ノアザミ		<i>Cirsium japonicum</i>	石寺町、福里町、大藪町、金亀町、笹尾町、立花町、田附町、野瀬町、古沢町、本庄町、三津屋町、愛知川、平田川、雨壺山、荒神山、佐和山、曾根沼、彦根城						
ノゲシ	ハルノノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i>	大藪町、金亀町、立花町、野瀬町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、三津屋町、平田川、雨壺山、曾根沼、彦根城						
ノコンギク		<i>Aster ageratoides ssp. ovatus</i>	男鬼町、尾末町、金亀町、笹尾町、新海町、芹川町、鳥居本町、武奈町、古沢町、三津屋町、和田町、犬上川、雨壺山、佐和山、彦根城						
ノブキ		<i>Adenocaulon himalaicum</i>	男鬼町、武奈町、本庄町、佐和山						
ノボロギク		<i>Senecio vulgaris</i>	清崎町、金亀町、佐和町、新海町、鳥居本町、野瀬町、八坂町、日夏町、松原町、彦根城					帰化	

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等	
キク	ハイイロヨモギ		<i>Artemisia sieversiana</i>	男鬼町					帰化	
	ハキダメギク		<i>Galinsoga ciliata</i>	大藪町、尾末町、後三条町、金亀町、新海町、新町、鳥居本町、長曾根南町、日夏町、平田町、本庄町、山之脇町、和田町、雨壺山、荒神山、彦根城					帰化	
	ハコネヒヨドリ		<i>Eupatorium glehni var. hakonense</i>	男鬼町						
	ハナニガナ		<i>Ixeris dentata var. albiflora f. amplifolia</i>	笹尾町						
	ハハコグサ		<i>Gnaphalium affine</i>	稲部町、小野町、京町、清崎町、笹尾町、城町、立花町、中央町、野瀬町、八坂町、日夏町、普光寺町、古沢町、本庄町、三津屋町、和田町、犬上川、曾根沼					史前帰化	
	バラモンジン		<i>Tragopogon porrifolius</i>	高宮町					帰化	
	ハルジオン		<i>Erigeron philadelphicus</i>	尾末町、金亀町、笹尾町、中央町、野瀬町、日夏町、仏生寺町、古沢町、三津屋町、曾根沼、彦根城					帰化	
	ハルシャギク		<i>Coreopsis tinctoria</i>	新海町、野田山町、八坂町、愛知川					帰化	
	ヒメジョオン		<i>Stenactis annuus</i>	尾末町、開出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、長曾根町、八坂町、日夏町、武奈町、古沢町、松原町、宮田町、和田町、犬上川、芹川、平田川、雨壺山、野田沼、彦根城、湖岸					帰化	
	ヒメヒレアザミ		<i>Carduus pycnocephalus</i>	芹川町、外町、長曾根南町、芹川					帰化	
	ヒメムカシヨモギ		<i>Erigeron canadensis</i>	石寺町、宇尾町、男鬼町、清崎町、金亀町、笹尾町、薩摩町、松原町、犬上川、彦根城、湖岸					帰化	
	ヒヨドリバナ		<i>Eupatorium chinense var. oppositifolium</i>	大堀町、男鬼町、小野町、金亀町、笹尾町、佐和山町、荘厳寺町、正法寺町、新町、鳥居本町、日夏町、仏生寺町、古沢町、宮田町、和田町、芹川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城						
	ヒメヨモギ		<i>Artemisia feddei</i>	石寺町、男鬼町、須越町、八坂町、犬上川		C		IV		
	ヒロハタンポポ		<i>Taraxacum longependiculatum</i>	三津屋町、曾根沼						
	ヒロハホウキギク		<i>Aster subulatus</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、下岡部町、鳥居本町、中山町、野瀬町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、三津屋町、宮田町、安清町、和田町、犬上川、荒神山、曾根沼、彦根城					帰化	
	フキ		<i>Petasites japonicus</i>	宇尾町、金亀町、笹尾町、古沢町、犬上川、彦根城						
	フジバカマ		<i>Eupatorium japonicum</i>			VU	A	IV	B	史前帰化
	ブタクサ		<i>Ambrosia artemisiifolia var. elatior</i>	大藪町、男鬼町、清崎町、金亀町、笹尾町、佐和山町、新海町、立花町、長曾根南町、野瀬町、八坂町、馬場、日夏町、本庄町、松原町、和田町、愛知川、平田川、雨壺山					帰化	
	ブタナ		<i>Hypochoeris radicata</i>	荘厳寺町、新海町、八坂町、松原町					帰化	
	フランスギク		<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	荒神山					帰化	
	ベニバナボロギク		<i>Crassocephalum crepidioides</i>	小野町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、田附町、日夏町、武奈町、山之脇町、愛知川、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城					帰化	
	ヘラバヒメジョオン		<i>Erigeron strigosus</i>	新海浜、雨壺山					帰化	
	ホンバアキノノゲシ		<i>Lactuca indica f. indivisa</i>	小野町、小泉町、松原町、宮田町、雨壺山						
	ミツバサワヒヨドリ		<i>Eupatorium lindleyanum f. trisectifolium</i>	笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、中山町、佐和山						
	ミヤマヨメナ		<i>Miyamayomena savatieri</i>	男鬼町、仏生寺町、武奈町						
	ムラサキニガナ		<i>Lactuca sororia</i>	金亀町、荘厳寺町、日夏町、荒神山、佐和山、彦根城						
	メナモミ		<i>Siegesbeckia orientalis ssp. pubescens</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、新町、鳥居本町、仏生寺町、和田町、雨壺山、彦根城					史前帰化	
	モトタカサブロウ	タカサブロウ	<i>Eclipta prostrata</i>	小野町、笹尾町					史前帰化	
	ヤクシソウ		<i>Youngia denticulata</i>	小野町、佐和山町、新町、日夏町、古沢町、山之脇町、和田町、雨壺山、荒神山、佐和山						
	ヤグルマギク		<i>Centaurea cyanus</i>	荒神山					帰化	
ヤナギバヒメジョオン		<i>Erigeron pseudo-annuus</i>	新海町							
ヤブタバコ		<i>Carpesium abrotanoides</i>	大堀町、男鬼町、金亀町、笹尾町、古沢町、山之脇町、雨壺山、荒神山、佐和山、彦根城							

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
キク	ヤブタビラコ		<i>Lapsana humilis</i>	金亀町、武奈町、原町、古沢町、三津屋町、佐和山、曾根沼、彦根城					
	ヤブレガサ		<i>Syneilesis palmata</i>	男鬼町					
	ヤマニガナ		<i>Lactuca raddeana var. elata</i>	男鬼町、佐和山					
	ヤマボクチ		<i>Synurus palmatopinnatifidus var. indivisus</i>	荒神山、佐和山					
	ヨシノアザミ		<i>Cirsium nipponicum var. yoshinoi</i>	男鬼町、金亀町、正法寺町、新町、芹橋、芹町、日夏町、古沢町、本庄町、山之脇町、和田町、芹川、雨壺山、荒神山、彦根城					
	ヨメナ		<i>Kalimeris yomena</i>	大藪町、金亀町、笹尾町、薩摩町、佐和山町、新海町、中藪町、長曾根町、野瀬町、野田山町、日夏町、平田町、古沢町、松原町、三津屋町、芹川、平田川、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ヨモギ		<i>Artemisia princeps</i>	男鬼町、開出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、須越町、芹川町、長曾根町、野瀬町、八坂町、日夏町、平田町、松原町、三津屋町、和田町、犬上川、平田川、曾根沼、彦根城、湖岸					史前帰化
オモダカ	アギナシ		<i>Sagittaria aginashi</i>		NT	A	III	B	
	ウリカワ		<i>Sagittaria pygmaea</i>					D	
	オモダカ		<i>Sagittaria trifolia</i>	大藪町、小野町、清崎町、笹尾町、薩摩町、佐和山町、芹川町、田附町、日夏町、松原町、宮田町、雨壺山、佐和山					
	クワイ		<i>Sagittaria trifolia var. edulis</i>	芹川町					帰化
	ナガバオモダカ		<i>Sagittaria graminea</i>	野田山町					帰化
	ヘラオモダカ		<i>Alisma canaliculatum</i>	野田山町、柳川町					
	ホソバオモダカ		<i>Sagittaria trifolia f. longiloba</i>	大藪町、小野町、開出今町、清崎町、小泉町、笹尾町、薩摩町、田附町、平田町、松原町、安清東町					
トチカガミ	オオカナダモ		<i>Egeria densa</i>	新海町、柳川町、湖岸					帰化
	クロモ		<i>Hydrilla verticillata</i>	薩摩町、新海町、馬場、三津屋町、南三ツ谷町、宇曾川、湖岸					
	コウガイモ		<i>Vallisneria denseerrulata</i>	琵琶湖		C	VI		
	コカナダモ		<i>Elodea nuttallii</i>	上稲葉町、犬上川					帰化
	トチカガミ		<i>Hydrocharis dubia</i>			C	VI	D	
	ネジレモ		<i>Vallisneria bivaensis</i>	薩摩町、馬場、湖岸			V		
	ミズオオバコ		<i>Ottelia japonica</i>	薩摩町、普光寺町					
	ヤナギスブタ		<i>Blyxa japonica</i>					B	
ヒルムシロ	オオササエビモ		<i>Potamogeton anguillanus</i>	新海町、馬場、湖岸			V		
	ササバモ		<i>Potamogeton malaianus</i>	新海町、三津屋町、宇曾川					
	センニンモ		<i>Potamogeton maackianus</i>	新海町、馬場、湖岸					
	ヒルムシロ		<i>Potamogeton distinctus</i>					D	
	ヒロハノエビモ		<i>Potamogeton perfoliatus</i>				V	D	
	ホソバミズヒキモ		<i>Potamogeton octandrus</i>	新海町					
	ヤナギモ		<i>Potamogeton oxyphyllus</i>	三津屋町、柳川町、宇曾川					
イバラモ	イバラモ		<i>Najas marina</i>	薩摩町、馬場、湖岸		C			
	ヒロハトリゲモ	サガトリゲモ	<i>Najas indica</i>		I B	A	IV	B	
	ホツスモ		<i>Najas graminea</i>	笹尾町					
ユリ	アマドコロ		<i>Polygonatum odoratum var. pluriflorum</i>	宮田町、佐和山					
	ウバユリ		<i>Lilium cordatum</i>	宇尾町、八坂町、古沢町、本庄町、犬上川、荒神山、佐和山					
	オオナルコユリ		<i>Polygonatum macranthum</i>	男鬼町、佐和山町、善谷町、佐和山					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ユリ	オニユリ		<i>Lilium lancifolium</i>	男鬼町、金亀町、薩摩町、雨壺山、佐和山、彦根城					
	オモト		<i>Rohdea japonica</i>	金亀町、彦根城					
	オランダキジカクシ		<i>Asparagus officinalis</i>	新海町、須越町、宮田町					帰化
	キチジョウソウ		<i>Reineckea carnea</i>	大堀町、金亀町、下稲葉町、田附町、野田山町、古沢町、犬上川、愛知川、佐和山、彦根城					
	キヨスミギボウシ		<i>Hosta kiyosumiensis</i>	男鬼町、古沢町					
	コオニユリ		<i>Lilium leichtliuii var. maximowiczii</i>					B	
	コバギボウシ		<i>Hosta sieboldii f. lancifolia</i>	笹尾町、佐和山町、鳥居本町、佐和山					
	コヤブラン	リュウキュウヤブラン		<i>Liriope spicata</i>	金亀町、新海町、八坂町、犬上川、彦根城、湖岸				
	ササユリ		<i>Lilium japonicum</i>	笹尾町					
	サルトリイバラ		<i>Smilax china</i>	大堀町、男鬼町、金亀町、笹尾町、正法寺町、日夏町、武奈町、荒神山、彦根城					
	シオデ		<i>Smilax riparia var. ussuriensis</i>	佐和山					
	ジャノヒゲ		<i>Ophiopogon japonicus</i>	金亀町、新海町、古沢町、彦根城					
	シュロソウ		<i>Veratrum maackii var. reymondianum</i>	犬上川					
	ショウジョウバカマ		<i>Heloniopsis orientalis</i>	笹尾町、鳥居本町、日夏町、荒神山、佐和山					
	タチシオデ		<i>Smilax nipponica</i>	佐和山					
	チゴユリ		<i>Disporum smilacinum</i>	男鬼町、笹尾町					
	ツルボ		<i>Scilla scilloides</i>	大堀町、京町、金亀町、松原町、三津屋町、雨壺山、彦根城、曽根沼					史前帰化
	ナガバジャノヒゲ		<i>Ophiopogon ohwii</i>	大堀町、金亀町、佐和山、彦根城					
	ナルコユリ		<i>Polygonatum falcatum</i>	男鬼町、佐和山					
	ナンカイギボウシ		<i>Hosta tardiva</i>	鳥居本町、古沢町、本庄町					
	ニラ		<i>Allium tuberosum</i>	金亀町、薩摩町、芹橋、日夏町、宮田町、蓮台寺町、芹川、湖岸		A			帰化
	ノギリ		<i>Aletris luteoviridis</i>	男鬼町、清崎町、笹尾町、善谷町、日夏町、荒神山					
	ノビル		<i>Allium grayi</i>	清崎町、金亀町、城町、長曾根南町、松原町、芹川、彦根城					
	ハナニラ		<i>Ipeion uniflorum</i>	長曾根南町、東沼波町、古沢町、荒神山、湖岸					帰化
	ハラン		<i>Aspidistra elatior</i>	宇尾町、金亀町、宮田町、犬上川、佐和山、彦根城					帰化
	ヒメヤブラン		<i>Liriope minor</i>	笹尾町、薩摩町、湖岸					
	ホウチャクソウ		<i>Disporum sessile</i>	男鬼町、下稲葉町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、原町、仏生寺町、犬上川、愛知川					
	ホトギス		<i>Tricyrtis hirta</i>	笹尾町					逸出
	ミヤマナルコユリ		<i>Polygonatum lasianthum</i>	男鬼町、原町、武奈町					
	ヤブカンゾウ		<i>Hemerocallis fulva var. kwanso</i>	宇尾町、大藪町、男鬼町、金亀町、笹尾町、薩摩町、新海町、古沢町、宮田町、和田町、犬上川、芹川、彦根城					史前帰化
ヤブラン		<i>Liriope muscari</i>	大藪町、金亀町、薩摩町、古沢町、宮田町、芹川、平田川、雨壺山、佐和山、彦根城						
ヤマジノホトギス		<i>Tricyrtis affinis</i>	男鬼町、原町						
ラッキョウ		<i>Allium chinense</i>	松原町					帰化	
ルリムスカリ		<i>Muscari botryoides</i>	長曾根南町、古沢町					帰化	
ヒガンバナ	オオキツネノカミソリ		<i>Lycoris sanguinea var. kiushiana</i>	男鬼町					
	スノーフレーク	スズランズイセン	<i>Leucium aestivum</i>	大堀町、長曾根南町、芹川、湖岸					帰化
	ナツズイセン		<i>Lycoris squamigera</i>	新海町、田附町、古沢町、荒神山		C			帰化
	ヒガンバナ		<i>Lycoris radiata</i>	開出今町、金亀町、野田山町、古沢町、松原町、平田川、彦根城					史前帰化

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ヒガンバナ	ラッパズイセン		<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	長曾根南町、湖岸					帰化
ヤマノイモ	オニドコロ		<i>Dioscorea tokoro</i>	金亀町、笹尾町、宮田町、犬上川、荒神山、佐和山、彦根城					
	カエデドコロ		<i>Dioscorea quinqueloba</i>	野田山町					
	キクバドコロ	モミジドコロ	<i>Dioscorea septemloba</i>	男鬼町					
	ナガイモ		<i>Dioscorea batatas</i>	稲里町、宇尾町、犬上川					
	ニガカシュウ		<i>Dioscorea bulbifera</i>	新海町、八坂町、本庄町、柳川町、犬上川、湖岸					
	ヤマノイモ		<i>Dioscorea japonica</i>	笹尾町、荘厳寺町、正法寺町、善谷町、中山町、宮田町、佐和山					
ミズアオイ	コナギ		<i>Monochoria vaginalis</i>	大藪町、小野町、開出今町、清崎町、小泉町、笹尾町、薩摩町、鳥居本町、野瀬町、肥田町、日夏町、平田町、松原町、佐和山					
	ホテイアオイ		<i>Eichhornia crassipes</i>	金亀町、松原町、彦根城					帰化
アヤメ	ウスギイロショウブ		<i>Iris pseudacorus cv. Pallida</i>	三津屋町、曾根沼					
	オオニワゼキショウ		<i>Sisyrinchium rossulatum</i>	鳥居本町、三津屋町、曾根沼					帰化
	カキツバタ		<i>Iris laevigata</i>		VU	C		D	
	キショウブ		<i>Iris pseudacorus</i>	三津屋町、和田町、曾根沼					帰化
	クロッカス		<i>Crocus vernus</i>	金亀町、彦根城					帰化
	シャガ		<i>Iris japonica</i>	金亀町、笹尾町、仏生寺町、古沢町、彦根城					史前帰化
	ニワゼキショウ		<i>Sisyrinchium atlanticum</i>	大藪町、尾末町、清崎町、薩摩町、佐和町、新海町、野瀬町、八坂町、日夏町、三津屋町、荒神山、曾根沼					帰化
	ノハナショウブ		<i>Iris ensata var. spontanea</i>			C	VI	D	
ヒメヒオウギズイセン		<i>Tritonia × crocosmaeflora</i>	金亀町、松原町、宮田町、佐和山、彦根城					帰化	
イグサ	アオコウガイゼキショウ		<i>Juncus papillosus</i>	笹尾町					
	イ		<i>Juncus effusus var. decipiens</i>	金亀町、笹尾町、新海町、芹川町、鳥居本町、野瀬町、八坂町、松原町、三津屋町、荒神山、曾根沼、佐和山、犬上川					史前帰化
	クサイ		<i>Juncus tenuis</i>	大堀町、河原、清崎町、金亀町、笹尾町、新海町、鳥居本町、野瀬町、八坂町、松原町、犬上川、芹川、湖岸、彦根城					史前帰化
	コウガイゼキショウ		<i>Juncus leschenaultii</i>	清崎町、笹尾町、新海町、田附町、鳥居本町、八坂町、三津屋町、犬上川、曾根沼、湖岸					史前帰化
	コモチコウガイゼキショウ		<i>Juncus monticola</i>	大藪町、小野町、清崎町、鳥居本町、松原町					
	コモチゼキショウ		<i>Juncus monticola</i>	笹尾町、新海町、鳥居本町、湖岸					
	スズメノヤリ		<i>Luzula capitata</i>	清崎町、金亀町、笹尾町、薩摩町、新海町、八坂町、古沢町、松原町、三津屋町、荒神山、曾根沼、彦根城					
	ヌカボシソウ		<i>Luzula plumosa var. macrocarpa</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、鳥居本町、彦根城					
	ハナビゼキショウ		<i>Juncus alatus</i>	新海町、愛知川					
	ハリコウガイゼキショウ		<i>Juncus wallichianus</i>	新海町、八坂町、犬上川					
	ヒメコウガイゼキショウ		<i>Juncus bufonius</i>					E	
	ホソイ		<i>Juncus setchuensis var. effusoides</i>	河原、金亀町、笹尾町、新海町、芹川町、鳥居本町、日夏町、松原町、和田町、芹川、湖岸、彦根城					
	ヤマスズメノヒエ		<i>Luzula multiflora</i>	男鬼町、小野町、笹尾町、中山町、野田山町、原町					
ツユクサ	イボクサ		<i>Murdannia keisak</i>	大藪町、清崎町、笹尾町、薩摩町、鳥居本町、野田山町、八坂町、日夏町、松原町、宮田町、佐和山					史前帰化
	ウスイロツユクサ		<i>Commelina communis f. caeruleopurpurascens</i>	笹尾町					
	ケツユクサ		<i>Commelina communis f. hebespatha</i>	小野町、笹尾町、善谷町、鳥居本町					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ツユクサ	シロバナツユクサ		<i>Commelina communis</i> f. <i>albiflora</i>	新海町					
	ツユクサ		<i>Commelina communis</i>	清崎町、金亀町、笹尾町、野瀬町、八坂町、平田町、本町、松原町、三津屋町、犬上川、平田川、雨壺山、曾根沼、彦根城					史前帰化
	トキワツユクサ	ノハカタカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i>	野田山町、八坂町、荒神山					帰化
	ムラサキツユクサ		<i>Tradescantia reflexa</i>	古沢町、荒神山					帰化
	ヤブミョウガ		<i>Pollia japonica</i>	金亀町、仏生寺町、古沢町、佐和山、彦根城					
ホシクサ	シロイヌノヒゲ		<i>Eriocaulon sikokianum</i>	笹尾町					
	ニッポシヌノヒゲ		<i>Eriocaulon hondoense</i>	笹尾町					
	ヒロハイヌノヒゲ		<i>Eriocaulon robustius</i>	笹尾町、中山町、松原町、宮田町、安清東町					
	ホシクサ		<i>Eriocaulon cinereum</i>			C	II	B	史前帰化
イネ	アオウシノケグサ		<i>Festuca ovina</i> var. <i>coreana</i>	石寺町、大塚町、笹尾町、薩摩町、芹川、湖岸					
	アオカモジグサ		<i>Agropyron racemiferum</i>	笹尾町、新海町、長曾根南町、中藪、三津屋町、曾根沼、犬上川、愛知川、湖岸					
	アオチカラシバ		<i>Pennisetum alopecuroides</i> f. <i>viridescens</i>	芹川					
	アキノエノコログサ		<i>Setaria faberi</i>	石寺町、清崎町、金亀町、笹尾町、薩摩町、新海町、鳥居本町、中藪、野瀬町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、三津屋町、和田町、犬上川、平田川、荒神山、佐和山、平田川、彦根城、湖岸					
	アキメヒシバ		<i>Digitaria violascens</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、新海町、立花町、鳥居本町、八坂町、三津屋町					史前帰化
	アシボソ		<i>Microstegium vimineum</i> var. <i>polystachyum</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、彦根城					
	アズマガヤ		<i>Asperella longe-aristata</i>	本庄町、愛知川					
	アゼガヤ		<i>Leptochloa chinensis</i>				VI	D	
	アブラスキ		<i>Echinochloa crus-galli</i>	尾末町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、正法寺町、鳥居本町、古沢町、佐和山、彦根城					
	アメリカスズメノヒエ		<i>Paspalum notatum</i>	大藪町、新海町、八坂町					帰化
	アラゲメヒシバ		<i>Digitaria violascens</i> var. <i>lasiophylla</i>	三津屋町、曾根沼					
	イヌビエ		<i>Echinochloa crus-galli</i>	石寺町、大藪町、開出今町、清崎町、笹尾町、立花町、長曾根南町、野瀬町、日夏町、普光寺町、古沢町、本庄町、松原町、宮田町、安清東町、和田町、犬上川、芹川、佐和山、平田川、湖岸、野田沼、雨壺山					史前帰化
	イヌムギ		<i>Bromus catharticus</i>	大藪町、尾末町、清崎町、金亀町、新海町、長曾根南町、野瀬町、八坂町、平田町、古沢町、本庄町、本町、松原町、元町、和田町、犬上川					帰化
	イブキヌカボ		<i>Milium effusum</i>	男鬼町					
	ウシノケグサ		<i>Festuca ovina</i>	小野町、清崎町、下稲葉町、荒神山、愛知川					
	ウシノシツペイ		<i>Hemarthria sibirica</i>	新海町、須越町、野田山町、八坂町、古沢町、愛知川、野田沼					
	ウスゲトダシバ		<i>Arundinella hirta</i> var. <i>ciliata</i>	笹尾町、荘厳寺町、長曾根南町、中山町、三津屋町、佐和山、曾根沼					
	ウマノチャヒキ		<i>Bromus tectorum</i>	広野町、犬上川					帰化
	エゾヌカボ		<i>Agrostis scabra</i>	八坂町					逸出
	エノコログサ		<i>Setaria viridis</i>	尾末町、金亀町、笹尾町、薩摩町、新海町、須越町、立花町、八坂町、日夏町、古沢町、松原町、彦根城、湖岸					
オオアワガエリ		<i>Phleum pratense</i>	芹川					帰化	
オオイチゴツナギ		<i>Poa nipponica</i>	男鬼町、笹尾町、佐和山町						
オオエノコロ		<i>Setaria</i> × <i>pyncnoma</i>	石寺町、大塚町、薩摩町、新海町、平田町、船町、本庄町、松原町、和田町、平田川、旧彦根港						
オオクサキビ		<i>Panicum dichotomiflorum</i>	大藪町、銀座町、笹尾町、薩摩町、佐和山町、田附町、長曾根南町、松原町、安清町、和田町					帰化	

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
イネ	オオスズメノカタビラ		<i>Poa trivialis</i>	大塚町、大藪町、小野町、清崎町、小泉町、金亀町、笹尾町、薩摩町、須越町、鳥居本町、長曾根南町、中藪、八坂町、日夏町、松原町、三津屋町、安清東町、和田町、犬上川、芹川、湖岸、野田沼、佐和山、彦根城					帰化
	オオニワホコリ		<i>Eragrostis multispicula</i>	長曾根南町、八坂町、平田川					帰化
	オカメザサ		<i>Shibataea kumasasa</i>	大塚町					逸出
	オガルカヤ		<i>Cymbopogon tortilis var. goeringii</i>					D	
	オギ		<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	新海町					
	オニウシノケグサ		<i>Festuca arundinacea</i>	石寺町、大藪町、男鬼町、小野町、金亀町、笹尾町、薩摩町、新海町、須越町、長曾根南町、野瀬町、八坂町、普光寺町、仏生寺町、松原町、芹川					帰化
	オヒシバ		<i>Eleusine indica</i>	大藪町、開出今町、清崎町、金亀町、笹尾町、立花町、八坂町、日夏町、松原町、三津屋町、和田町、彦根城、曾根沼					史前帰化
	カズノコグサ		<i>Beckmannia syzigachne</i>	清崎町、新海町、田附町、八坂町、松原町、犬上川、野田沼					史前帰化
	カゼクサ		<i>Eragrostis ferruginea</i>	男鬼町、開出今町、金亀町、笹尾町、薩摩町、鳥居本町、馬場、日夏町、古沢町、松原町、三津屋町、犬上川、平田川、曾根沼、湖岸					史前帰化
	カニツリグサ		<i>Trisetum bifidum</i>	石寺町、男鬼町、小野町、金亀町、笹尾町、新海町、鳥居本町、八坂町、三津屋町、和田町、荒神山、曾根沼、彦根城、湖岸					
	カモガヤ		<i>Dactylis glomerata</i>	大藪町、男鬼町、河原、金亀町、芹川町、長曾根南町、野瀬町、八坂町、普光寺町、仏生寺町、松原町、和田町、犬上川、芹川、平田川、荒神山、彦根城					帰化
	カモジグサ		<i>Agropyron tsukushiense var. transiens</i>	大藪町、尾末町、清崎町、笹尾町、芹川町、八坂町、日夏町、松原町、三津屋町、安清東町、和田町、犬上川、曾根沼					
	カラスムギ		<i>Avena fatua</i>	大塚町、大藪町、広野町、長曾根町、長曾根南町、八坂町、日夏町、松原町、犬上川、芹川、平田川					史前帰化
	キシウスズメノヒエ		<i>Paspalum distichum</i>	薩摩町、新海町、須越町、八坂町、肥田町、船町、松原町、三津屋町、宮田町、安清東町、犬上川、宇曾川、芹川、野田沼、湖岸、旧彦根港					帰化
	キダチノズミガヤ		<i>Muhlenbergia ramosa</i>	男鬼町					
	キツネガヤ		<i>Bromus pauciflorus</i>	金亀町、柴町、笹尾町、佐和山町、善谷町、鳥居本町、中山町、八坂町、古沢町、犬上川、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ギョウギシバ		<i>Cynodon dactylon</i>	金亀町、須越町、長曾根南町、八坂町、原町、松原町、柳川町、湖岸					史前帰化
	キンエノコロ		<i>Setaria pumilla</i>	石寺町、金亀町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町、仏生寺町、古沢町、松原町、三津屋町、荒神山、佐和山、彦根城					史前帰化
	クサヨシ		<i>Phalaris arundinacea</i>	大藪町、小泉町、笹尾町、薩摩町、八坂町、日夏町、松原町、三津屋町、犬上川、曾根沼					
	クマザサ		<i>Sasa veitchii</i>	金亀町、彦根城					植栽
	ケイヌビエ		<i>Echinochloa crus-galli var. echinata</i>	大藪町、清崎町、鳥居本町、日夏町、本庄町、松原町、宮田町、和田町、犬上川、芹川					
	ケチヂミザサ	チヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、中山町、日夏町、荒神山、彦根城					
	ケトダンバ		<i>Arundinella hirta f. hirta</i>	笹尾町、荘厳寺町					
	コウライシバ		<i>Zoysia tenuifolia</i>	八坂町					
コスズメガヤ		<i>Eragrostis poaeoides</i>	石寺町、新海町、須越町、大東町、鳥居本町、八坂町、愛知川					帰化	
コチヂミザサ		<i>Oplismenus undulatifolius var. japonicus</i>	宇尾町、金亀町、笹尾町、日夏町、古沢町、三津屋町、佐和山、彦根城、雨壺山、曾根沼、犬上川						
コツブキンエノコロ		<i>Setaria pallide-fusca</i>	石寺町、尾末町、小野町、笹尾町、薩摩町、須越町、鳥居本町、平田町、松原町、三津屋町、荒神山、佐和山、湖岸						

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
イネ	コヌカグサ		<i>Agrostis alba</i>	石寺町、大藪町、金亀町、薩摩町、新海町、野瀬町、八坂町、原町、犬上川、愛知川、芹川、荒神山					帰化
	コバンソウ		<i>Briza maxima</i>	稲部町、清崎町、新海町、長曾根町、野瀬町、八坂町、日夏町、平田町、松原町、三津屋町、犬上川、愛知川、荒神山、佐和山、曾根沼、湖岸					帰化
	コブナグサ		<i>Arthraxon hispidus</i>	男鬼町、清崎町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、雨壺山					
	コメガヤ		<i>Melica nutans</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、原町、武奈町、本庄町、愛知川、芹川、佐和山、彦根城					
	コメヒシバ		<i>Digitaria radicata</i>	尾末町、金亀町、芹町、松原町、三津屋町、平田川、曾根沼、彦根城					
	ササガヤ		<i>Microstegium japonicum</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、正法寺町、善谷町、鳥居本町、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ササクサ		<i>Lophatherum gracile</i>	小野町、金亀町、笹尾町、善谷町、佐和山、彦根城					
	サヤヌカグサ		<i>Leersia sayanuka</i>	小野町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、彦根城、佐和山					
	シナダレスズメガヤ		<i>Eragrostis curvula</i>	小泉町、長曾根町、八坂町、松原町、犬上川					帰化
	シバ		<i>Zoysia japonica</i>	新海浜、立花町					
	シマスズメノヒエ		<i>Paspalum dilatatum</i>	清崎町、金亀町、新海浜、芹川町、鳥居本町、野田山町、八坂町、馬場、本町、松原町、三津屋町、宮田町、芹川、曾根沼、野田沼					帰化
	ジュズダマ		<i>Coix lacryma-jobi</i>	尾末町、金亀町、荘厳寺町、松原町、宮田町					帰化
	シラゲガヤ		<i>Holcus lanatus</i>	清崎町、新海町、日夏町、荒神山					帰化
	ススキ		<i>Miscanthus sinensis</i>	河原、金亀町、笹尾町、新町、鳥居本町、和田町、芹川、佐和山、平田川、雨壺山、彦根城					
	スズメガヤ		<i>Eragrostis ciliaris</i>	新海町、新海町、鳥居本町、松原町、愛知川、芹川					
	スズメノカタビラ		<i>Poa annua</i>	尾末町、清崎町、金亀町、笹尾町、佐和山町、中藪、野瀬町、八坂町、日夏町、平田町、松原町、和田町、芹川、彦根城、湖岸					史前帰化
	スズメノチャヒキ		<i>Bromus japonicus</i>	大藪町、小泉町、幸町、新海町、八坂町、松原町、三津屋町、愛知川					史前帰化
	スズメノテッポウ		<i>Alopecurus aequalis</i>	大藪町、金亀町、笹尾町、八坂町、日夏町、松原町、宮田町					史前帰化
	スズメノヒエ		<i>Paspalum thunbergii</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、松原町、三津屋町、曾根沼、平田川、彦根城、野田沼、雨壺山					
	セイタカヨシ	セイコノヨシ	<i>Phragmites karka</i>	大藪町、新海町、八坂町、湖岸					
	セイバンモロコシ		<i>Sorghum halepense</i>	石寺町、大藪町、幸町、芹川町、松原町					帰化
	タイヌビエ		<i>Echinochloa crus-galli var. oryzicola</i>	開出今町、笹尾町、佐和山町、正法寺町、日夏町、松原町、宮田町、安清東町					
	タチスズメノヒエ		<i>Paspalum urvillei</i>	長曾根町、八坂町、日夏町、犬上川、荒神山、湖岸					帰化
	タツノヒゲ		<i>Diarrhena japonica</i>	男鬼町、金亀町、中山町、彦根城					
	ダンチク		<i>Arundo donax</i>	宇曾川					逸出
	チガヤ	フシゲチガヤ	<i>Imperata cylindrica var. koenigii</i>	清崎町、笹尾町、薩摩町、竹ヶ鼻町、鳥居本町、八坂町、普光寺町、松原町、三津屋町					史前帰化
	チカラシバ		<i>Pennisetum alopecuroides f. purpurascens</i>	大藪町、金亀町、笹尾町、野瀬町、日夏町、古沢町、雨壺山、佐和山、彦根城					史前帰化
	チクゴスズメノヒエ		<i>Paspalum distichum var. indutum</i>	薩摩町、下稲葉町、新海町、八坂町、柳川町、愛知川					帰化
	チゴザサ		<i>Isachne globosa</i>	大藪町、笹尾町、松原町、三津屋町、芹川					
	チマキザサ		<i>Sasa palmata</i>	金亀町、笹尾町、鳥居本町、彦根城					
ツルヨシ		<i>Phragmites japonica</i>	大藪町、開出今町、八坂町、東沼波町、犬上川、芹川						
ドジョウツナギ		<i>Glyceria ischyronoura</i>	男鬼町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町						
トボシガラ		<i>Festuca parvigluma</i>	小野町、清崎町、金亀町、笹尾町、田附町、原町、三津屋町、荒神山、佐和山、曾根沼、彦根城						
ナガハグサ		<i>Poa pratensis</i>	石寺町、新海町、須越町、芹川町、田附町、八坂町、原町、平田町、武奈町、松原町、愛知川、平田川、荒神山、野田沼					帰化	

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
イネ	ナギナタガヤ		<i>Vulpia myuros</i>	稲部町、金亀町、薩摩町、新海町、須越町、長曾根南町、八坂町、松原町、三津屋町、和田町、愛知川、曾根沼					帰化
	ナルコビエ		<i>Eriochloa villosa</i>	雨壺山					
	ニコゲヌカキビ		<i>Panicum lanuginosum</i>	石寺町、新海町					
	ニワホコリ		<i>Eragrostis multicaulis</i>	大藪町、金亀町、薩摩町、須越町、芹川、彦根城					史前帰化
	ヌカキビ		<i>Panicum bisulcatum</i>	稲枝町、金田町、金亀町、笹尾町、田附町、鳥居本町、日夏町、本庄町、松原町、柳川町、雨壺山、荒神山、彦根城					史前帰化
	ヌカススキ		<i>Aira caryophyllaea</i>	新海町					帰化
	ヌカボ		<i>Agrostis clavata ssp. matsumurae</i>	男鬼町、小野町、笹尾町、野瀬町、八坂町、原町、三津屋町、安清東町、佐和山、曾根沼					史前帰化
	ヌカボシソウ		<i>Luzula plumosa var. macrocarpa</i>	男鬼町、金亀町、笹尾町、鳥居本町、彦根城					
	ヌメリグサ		<i>Sacciolepis indica var. oryzetorum</i>	小野町、笹尾町、新海町、鳥居本町、中山町、肥田町、松原町、佐和山					史前帰化
	ネズミガヤ		<i>Muhlenbergia japonica</i>	里根町					
	ネズミノオ		<i>Sporobolus fertilis</i>	金亀町、新海町、八坂町、荒神山、雨壺山、彦根城					史前帰化
	ネズミホソムギ		<i>Lolium × hybridum</i>	大藪町、広野町、長曾根南町、犬上川					帰化
	ネズミムギ		<i>Lolium multiflorum</i>	尾末町、小泉町、広野町、金亀町、新海町、長曾根町、八坂町、日夏町、平田町、松原町、元町、犬上川、愛知川、湖岸					帰化
	ノガリヤス		<i>Calamagrostis arundinacea var. brachytricha</i>	金亀町、笹尾町、正法寺町、荒神山、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ハイチゴザサ		<i>Isachne nipponensis</i>	正法寺町、中山町					
	ハイヌメリ		<i>Sacciolepis indica</i>	上稲葉町、笹尾町、新海町、三津屋町、曾根沼					史前帰化
	ハガワリトボシガラ		<i>Festuca heterophylla</i>	長曾根南町					帰化
	ハチク		<i>Phyllostachys nigra var. henonis</i>	下稲葉町、古沢町、愛知川					帰化
	ハナヌカススキ		<i>Aira elegans</i>	薩摩町、新海町、野瀬町、八坂町、三津屋町、曾根沼					帰化
	ハルガヤ		<i>Anthoxanthum odoratum</i>	石寺町、新海町、野瀬町、柳川町、湖岸					
	ヒエガエリ		<i>Polygonum fugax</i>	池州町、大藪町、尾末町、小野町、清崎町、長曾根町、野瀬町、八坂町、普光寺町、仏生寺町、本町、松原町、三津屋町、和田町、芹川、平田川、荒神山、曾根沼					
	ヒゲナガスズメノチャヒキ		<i>Bromus rigidus</i>	新海町、中藪、本庄町、松原町、柳川町、愛知川、湖岸					帰化
	ヒメアシボン		<i>Microstegium vimineum</i>	金亀町、笹尾町、荘厳寺町、元町、彦根城					
	ヒメイヌビエ		<i>Echinochloa crus-galli var. praticola</i>	大藪町、清崎町、金亀町、新海町、立花町、八坂町、馬場、日夏町、平田町、普光寺町、古沢町、松原町、山之脇町、和田町、犬上川、雨壺山、彦根城、湖岸					
	ヒメコヌカグサ		<i>Agrostis nipponensis</i>		NT	C	VI	D	
	ヒメコパンソウ		<i>Briza minor</i>	尾末町、清崎町、新海町、長曾根南町、野瀬町、八坂町、日夏町、三津屋町、和田町、曾根沼、野田沼					帰化
	ヒメヌカススキ		<i>Aira elegans ssp. amabiqua</i>	新海町、八坂町					帰化
	ヒメモロコシ		<i>Sorghum halepense f. muticum</i>	大堀町、大藪町、尾末町、幸町、城町、長曾根町、平田町、普光寺町、松原町、犬上川、平田川					帰化
	ヒロハイスノヒゲ		<i>Eriocaulon robustius</i>	笹尾町					
	ヒロハノウシノケグサ		<i>Festuca pratensis</i>	薩摩町、松原町、三津屋町、荒神山、湖岸					帰化
ホソムギ	ライグラス	<i>Lolium perenne</i>	大藪町、清崎町、広野町、松原町、宮田町、犬上川、湖岸					帰化	
マコモ		<i>Zizania latifolia</i>	金亀町、松原町、三津屋町、曾根沼、野田沼、彦根城						
マダケ		<i>Phyllostachys bambusoides</i>	大堀町、開出今町、金亀町、田附町、犬上川、芹川、愛知川、彦根城						

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
イネ	ミゾイチゴツナギ		<i>Poa acroleuca</i>	尾末町、金亀町、中山町、原町、古沢町、佐和山、彦根城					
	ミドリカモジグサ		<i>Agropyron semicostatum var. viridispicum</i>	日夏町					
	ミヤマササガヤ		<i>Microstegium nudum</i>	小野町					
	ムツオレグサ		<i>Glyceria acutiflora</i>	笹尾町、佐和山町、鳥居本町、宮田町					
	ムラサキアキノエノコログサ		<i>Setaria faberi f. purpurascens</i>	古沢町					
	ムラサキエノコロ		<i>Setaria viridis f. misera</i>	尾末町、清崎町、金亀町、立花町、古沢町、本町、松原町、宮田町、和田町、平田川					
	ムラサキオオエノコロ		<i>Setaria pycnocomia f. purpurascens</i>	石寺町、大堀町、新海町、古沢町、本庄町、松原町					
	メダケ		<i>Pleioblastus simonii</i>	大堀町、金亀町、山之脇町、雨壺山、彦根城					
	メヒシバ		<i>Digitaria ciliaris</i>	大藪町、男鬼町、清崎町、金亀町、笹尾町、新海町、新海浜、芹川町、鳥居本町、八坂町、日夏町、平田町、本町、松原町、三津屋町、和田町、芹川、彦根城、曾根沼					史前帰化
	メリケンカルカヤ		<i>Andropogon virginicus</i>	開出今町、笹尾町、長曾根町、長曾根南町、野瀬町、八坂町、日夏町、松原町、芹川、平田川、雨壺山					帰化
	モウソウテク		<i>Phyllostachys pubescens</i>	古沢町					帰化
	ヤクナガイヌムギ		<i>Bromus carinatus</i>	大堀町、大藪町、清崎町、八坂町、日夏町、松原町					
	ヤダケ		<i>Pseudosasa japonica</i>	金亀町、彦根城					
	ヤマアワ		<i>Calamagrostis epigeios</i>	芹川町、西今町、古沢町					
ヤマヌカボ		<i>Agrostis clavata</i>	笹尾町、日夏町、三津屋町、雨壺山						
ヨシ		<i>Phragmites australis</i>	大藪町、笹尾町、新町、長曾根南町、野瀬町、馬場、日夏町、松原町、三津屋町、和田町、平田川、湖岸、曾根沼、佐和山						
ヤシ	シュロ		<i>Trachycarpus fortunei</i>	大堀町、金亀町、彦根城					
サトイモ	カラスビシャク		<i>Pinellia ternata</i>	銀座町、金亀町、立花町、元町、彦根城					
	ショウブ		<i>Acorus calamus</i>	三津屋町、曾根沼					
	セキショウ		<i>Acorus gramineus</i>	荘厳寺町					
	マムシグサ		<i>Arisaema serratum</i>	男鬼町、下稲葉町、中山町、八坂町、原町、仏生寺町、武奈町、宮田町、犬上川、愛知川					
	ムサシアブミ		<i>Arisaema ringes</i>	金亀町、彦根城					逸出？
ウキクサ	アオウキクサ		<i>Lemna aoukikusa</i>	尾末町、馬場、松原町、旧彦根港					
	ウキクサ		<i>Spirodela polyrhiza</i>	尾末町、小野町、笹尾町、八坂町					
	コウキクサ		<i>Lemna minor</i>	尾末町、船町、松原町、旧彦根港					
	ミジンコウキクサ		<i>Wolffia arrhiza</i>	尾末町、船町、松原町、旧彦根港					帰化
ミクリ	ナガエミクリ		<i>Sparganium japonicum</i>	薩摩町、戸賀町、本庄町、犬上川	NT	準			
	ミクリ		<i>Sparganium erectum ssp. stoloniferum</i>		NT	A	VI	D	
	ヤマトミクリ		<i>Sparganium fallax</i>		VU	C	V	D	
ガマ	ガマ		<i>Typha latifolia</i>	大藪町、笹尾町、芹川町					
	コガマ		<i>Typha orientalis</i>	大藪町、笹尾町、鳥居本町、野田山町、平田町、古沢町、宮田町、蓮台寺町、安清東町		C	VI		
	ヒメガマ		<i>Typha angustifolia</i>	大藪町、八坂町、日夏町、犬上川					
カヤツリグサ	アイダクグ		<i>Cyperus brevifolius</i>	笹尾町、薩摩町、新海町、八坂町、古沢町、松原町、元町、荒神山、佐和山、湖岸					
	アイバソウ		<i>Scirpus wichurae f. wichurai</i>	笹尾町、荘厳寺町、日夏町、荒神山					
	アオガヤツリ		<i>Cyperus nipponicus</i>	石寺町、大藪町、上稲葉町、清崎町、新海町、須越町、田附町、長曾根町、西今町、八坂町、馬場、普光寺町、本庄町、松原町、安清東町、柳川町、犬上川、愛知川、湖岸					

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
カヤツリグサ	アオスゲ		Carex breviculmis	男鬼町、小野町、清崎町、金亀町、笹尾町、佐和山町、田附町、八坂町、日夏町、古沢町、本庄町、三津屋町、柳川町、愛知川、荒神山、佐和山、曾根沼、彦根城					史前帰化
	アオテンツキ		Fimbristylis verrucifera				Ⅲ	B	
	アオバスゲ		Carex insanae var. papillatuculmis					D	
	アゼガヤツリ		Cyperus globosus	小野町、笹尾町、芹川町、西今町、日夏町、平田町、本庄町、愛知川					
	アゼスゲ		Carex thunbergii	笹尾町、佐和山町、鳥居本町、三津屋町、佐和山、曾根沼					
	アゼテンツキ		Fimbristylis squarrosa			A	Ⅵ	C	史前帰化
	アゼナルコ	アゼナルコスゲ	Carex dimorpholepis	大塚町、大藪町、笹尾町、新海町、芹川町、田附町、八坂町、日夏町、本庄町、松原町、三津屋町、安清東町、柳川町、愛知川、芹川、荒神山、曾根沼					
	アブラガヤ		Scirpus wichurae	笹尾町、日夏町、荒神山					
	イガガヤツリ		Cyperus polystachyos	新海町、須越町、八坂町、犬上川、荒神山、野田沼					
	イヌホタルイ		Scirpus juncooides var. ohwianus	大藪町、小野町、開出今町、笹尾町、薩摩町、荘厳寺町、鳥居本町、西今町、野瀬町、野田山町、平田町、普光寺町、仏生寺町、古沢町、松原町、安清東町、和田町、佐和山					
	ウキヤガラ		Scirpus yagara	須越町、八坂町、松原町、三津屋町、犬上川、曾根沼、野田沼					
	ウシクグ		Cyperus orthostachyus	笹尾町、荘厳寺町					
	ウマスゲ		Carex idzuroei			B	Ⅲ	D	
	エナシヒゴクサ		Carex aphanolepis	本庄町、松原町、愛知川					
	オオアオスゲ		Carex leucochlora var. lanchochora	金亀町、彦根城		B			
	オオシロガヤツリ		Cyperus nipponicus var. spiralis			C	Ⅲ	D	
	オオハリイ		Eleocharis congesta f. dolichochaeta	正法寺町					
	オクノカンスゲ		Carex foliosissima	男鬼町、荘厳寺町、本庄町、愛知川					
	オタルスゲ		Carex otaruensis	原町					
	オニナルコスゲ		Carex vesicaria			A	Ⅵ	B	
	カサスゲ		Carex dispalata	大藪町、男鬼町、佐和山町、須越町、竹ヶ鼻町、田附町、八坂町、日夏町、三津屋町、愛知川、荒神山、曾根沼、野田沼					
	カヤツリグサ		Cyperus microiria	大藪町、尾末町、清崎町、金亀町、新海町、芹橋、芹町、田附町、長曾根町、長曾根南町、野瀬町、八坂町、馬場、普光寺町、古沢町、本庄町、松原町、三津屋町、犬上川、芹川、曾根沼、湖岸					史前帰化
	カワラスガナ		Cyperus sanguinolentus	大藪町、笹尾町、新海町、中山町、西今町、野田山町、松原町、三津屋町、曾根沼					史前帰化
	カワラスゲ		Carex incisa	男鬼町、笹尾町					
	カンガレイ		Scirpus triangulatus	大藪町、笹尾町、八坂町、松原町、宮田町、犬上川					
	キンガヤツリ	ムツオレガヤツリ	Cyperus odoratus	正法寺町、新海町、立花町、田附町、長曾根町、八坂町、古沢町、松原町、三津屋町、曾根沼					帰化
	キンキカサスゲ		Carex persistens	笹尾町、佐和町、荘厳寺町、鳥居本町、中山町、西今町、仏生寺町					
	クグガヤツリ		Cyperus compressus	清崎町、金亀町、田附町、長曾根南町、西今町、八坂町、普光寺町、本庄町、三津屋町、曾根沼					
	クサスゲ		Carex rugata	小野町、笹尾町、佐和山町、鳥居本町、中山町、原町、日夏町、荒神山					
	クロカワズスゲ		Carex arenicola	笹尾町、薩摩町、三津屋町、曾根沼、湖岸					
クログワイ		Eleocharis kuroguwai	大藪町、小野町、笹尾町、正法寺町、田附町、宮田町、佐和山						
クロテンツキ		Fimbristylis diphyloides	尾末町、松原町、三津屋町、南三ツ谷町、曾根沼						
コアゼガヤツリ		Cyperus haspan	小野町、笹尾町、新海町、鳥居本町、三津屋町、宮田町、曾根沼					史前帰化	
ゴウン		Carex maximowiczii	小野町、笹尾町、三津屋町、荒神山、曾根沼						

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
カヤツリグサ	コカスゲ		Carex reinii	原町					
	コゴメガヤツリ		Cyperus iria	大藪町、小野町、開出今町、河原、清崎町、金亀町、薩摩町、新海町、須越町、田附町、中藪、野瀬町、八坂町、平田町、普光寺町、松原町、和田町、犬上川、芹川、野田沼、彦根城					史前帰化
	コジュズゲ		Carex parciflora var. macroglossa	笹尾町、佐和山町、鳥居本町、仏生寺町、武奈町、古沢町、荒神山					
	コマツカサスキ		Scirpus fuirenoides	日夏町、荒神山					
	サンカクイ		Scirpus triqueter	大藪町、笹尾町、新海町、八坂町、犬上川、愛知川					
	サンカクホタルイ		Scirpus × uzenensis	笹尾町					
	シカクイ		Eleocharis wichurae	笹尾町、鳥居本町					
	ジュズゲ		Carex ischnostachya	金亀町、笹尾町、佐和山町、荘厳寺町、善谷町、鳥居本町、日夏町、荒神山、佐和山、彦根城					
	シュロガヤツリ		Cyperus alternifolius	佐和山					植栽
	ショウジョウスゲ		Carex blepharicarpa	男鬼町					
	シラスゲ	ムシヤスゲ	Carex doniana	開出今町、金亀町、佐和山町、中山町、野田山町、八坂町、原町、本庄町、宮田町、和田町、愛知川、芹川、荒神山、佐和山、彦根城、					
	シロガヤツリ		Cyperus pacificus			A	II	C	
	タイワンヤマイ		Scirpus wallichii				VI	D	
	タガネソウ		Carex siderosticta	男鬼町、笹尾町					
	タカネマスキサ		Carex planata				III	C	
	タチスゲ		Carex maculata	笹尾町、鳥居本町、日夏町、荒神山					
	タマガヤツリ		Cyperus difformis	大藪町、小野町、開出今町、清崎町、笹尾町、薩摩町、須越町、芹川町、田附町、中藪、野瀬町、八坂町、肥田町、普光寺町、古沢町、本庄町、松原町、佐和山					史前帰化
	チャガヤツリ		Cyperus amuricus	薩摩町、八坂町、普光寺町、元町、犬上川、湖岸					
	テキリスゲ		Carex kiotensis	本庄町、愛知川					
	テンツキ		Fimbristylis dichotoma	金亀町、下稲葉町、西今町、八坂町、肥田町、平田町、普光寺町、三津屋町、犬上川、曾根沼					史前帰化
	ナキリスゲ		Carex lenta	大堀町、金亀町、笹尾町、荘厳寺町、新町、古沢町、松原町、和田町、矢倉川、雨壺山、佐和山、彦根城					
	ナルコスゲ		Carex curvicolis	男鬼町、笹尾町、三津屋町、曾根沼					
	ナンゴクカワラスガナ		Cyperus sanguinolentus f. sanguinolentus	笹尾町、正法寺町、野田山町					
	ニシノホンモンジスゲ		Carex stenostachys	男鬼町、笹尾町、荘厳寺町、原町					
	ノゲヌカスゲ		Carex mitrata var. aristata	金亀町、本庄町、愛知川、彦根城					
	ハタガヤ		Bulbostylis barbata	薩摩町、新海町、鳥居本町、八坂町、元町、柳川町、湖岸					
	ハマスゲ		Cyperus rotundus	大藪町、薩摩町、新海町、芹川町、長曾根南町、八坂町、馬場、松原、松原町、三津屋町、安清東町、犬上川、平田川、雨壺山、曾根沼、湖岸					
	ハリイ		Eleocharis congesta	笹尾町、佐和山町、荘厳寺町、正法寺町、鳥居本町、中山町、松原町、佐和山					
	ヒカゲスゲ		Carex lanceolata	笹尾町、中藪、雨壺山					
	ヒゴクサ	ヒゴスゲ	Carex japonica	本庄町、愛知川					
ヒデリコ		Fimbristylis miliacea	大藪町、清崎町、笹尾町、薩摩町、田附町、平田町、普光寺町、本庄町、松原町、三津屋町、雨壺山、曾根沼					史前帰化	
ヒナガヤツリ		Cyperus flaccidus	小野町、薩摩町、新海町、出路町、中山町、野瀬町、肥田町、松原町、宮田町、佐和山						
ヒメアオガヤツリ		Cyperus extremiorientalis				III	D		
ヒメクダ		Cyperus brevifolius var. leiolepis	大藪町、小野町、笹尾町、薩摩町、佐和山町、新海町、鳥居本町、中藪、八坂町、日夏町、宮田町					史前帰化	

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
カヤツリグサ	ヒメゴウン		Carex phacota	笹尾町、田附町、古沢町					
	ヒメシラスゲ		Carex mollicula	男鬼町、小野町、笹尾町、荘厳寺町、野田山町、原町、仏生寺町、武奈町					
	ヒメヒラテンツキ	ヒメテンツキ	Fimbristylis autumnalis	小野町、笹尾町、正法寺町、中山町、普光寺町					
	ヒメホタルイ		Scirpus lineolatus	新海町					
	ヒメモエギスゲ		Carex tristachya var. pocilliformis	原町、古沢町					
	ヒンジガヤツリ		Lipocarpa microcephala	稲里町、小野町、金沢町、笹尾町、荘厳寺町、田附町、肥田町、宮田町、佐和山					史前帰化
	フトイ		Scirpus tabernaemontani	八坂町、犬上川、芹川					
	ホンバカンスゲ		Carex morrowii var. temnolepis	石寺町、武奈町、荒神山					
	ホタルイ		Scirpus juncooides	大藪町、笹尾町、日夏町、松原町					
	マスクサ		Carex gibba	金亀町、栄町、佐和山町、鳥居本町、野田山町、原町、仏生寺町、古沢町、雨壺山、佐和山、彦根城					
	マツカサススキ		Scirpus mitsukurianus			C	VI	D	
	マツバイ		Eleocharis acicularis var. longiseta	笹尾町、馬場、日夏町、松原町、湖岸					史前帰化
	マツバスケ		Carex biwensis					D	
	マメスゲ		Carex pudica			C	VI	C	
	ミズガヤツリ		Cyperus serotinus	正法寺町、八坂町、古沢町、松原町、宮田町					史前帰化
	ミヤマカンスゲ		Carex multifolia	野田山町、原町、犬上川					
	ミヤマンラスゲ		Carex confertiflora	笹尾町、日夏町、三津屋町、荒神山、曾根沼					
	メアオスゲ		Carex breviculmis var. aphanandra	金亀町、原町、古沢町、彦根城					
	メアゼテンツキ		Fimbristylis velata	新海町、田附町、八坂町、安清東町、犬上川、湖岸					
	メリケンガヤツリ		Cyperus eragrostis	大藪町、尾末町、河原、清崎町、栄町、新海町、須越町、芹橋、芹町、中央町、八坂町、東沼波町、古沢町、本庄町、松原町、犬上川、芹川、平田川、荒神山					帰化
	モエギスゲ		Carex tristachya	小野町、笹尾町、佐和山町、日夏町、古沢町、荒神山					
	ヤマイ		Fimbristylis subbispicata	笹尾町、佐和山					
	ヤマテキリスゲ		Carex flabellata	石寺町、荒神山					
ヤワラスゲ		Carex transversa	本庄町、愛知川						
ショウガ	ミョウガ		Zingiber mioga	金亀町、彦根城					
ラン	アキザキヤツシロラン		Gastrodia verrucosa					E	
	アケボノシュスラン		Goodyera foliosa var. maximowicziana	男鬼町、佐和山町、荘厳寺町、鳥居本町、服部町、仏生寺町、本庄町、宮田町、愛知川					
	エビネ		Calanthe discolor		VU		VI	D	
	オオバノトンボソウ		Platanthera minor	日夏町、荒神山					
	カキラン		Epipactis thunbergii	笹尾町、野田山町					
	カヤラン		Sarcochilus japonicus				II	E	
	キンラン		Cephalanthera falcata		VU	C	III	D	
	ギンラン		Cephalanthera erecta				III	D	
	クモキリソウ		Liparis kumokiri				III	D	
	コ克蘭		Liparis nervosa	稲里町、善谷町、鳥居本町、宮田町					
	サイハイラン		Cremastra appendiculata					D	
	シュンラン		Cymbidium goeringii	大堀町、雨壺山					
	トンボソウ		Tulotis ussuriensis			準	VI	D	

科名	和名	別名	学名	生育地	国	近畿	県	市	植栽・帰化等
ラン	ナツエビネ		<i>Calanthe reflexa</i>		VU	A	VI	D	
	ネジバナ	モジズリ	<i>Spiranthes sinensis var. amoena</i>	男鬼町、尾末町、清崎町、金亀町、笹尾町、新海町、雨壺山、荒神山					
	ネジバナの白花品種		<i>Spiranthes sinensis var. amoena f. albescens</i>	佐和山					
	ミズトンボ		<i>Habenaria sagittifera</i>		VU	C	VI	C	
	ミヤマウスラ		<i>Goodyera schlechtendaliana</i>	鳥居本町、仏生寺町、荒神山					

検討を要する種

イネ	マンゴクドジョウツナギ		<i>Glyceria leptolepis</i>	薩摩町、八坂町、犬上川					
オシダ	ヌカイタチシダモドキ		<i>Dryopteris indusiata</i>	甲田町、笹尾町					