

集団健康診査を受ける前に

乳幼児健康診査は多くのお子さんが集まります。以下の感染症の診断を出されたり、症状がみられた場合は、当日の受診をお断りしています。体調が整ってから受診ください。



病気の名前	潜伏期間（※）	主な症状	集団健診可能時期
麻疹 （はしか）	9～10日	高熱、咳、鼻水、目やに 熱が下がった後、再び高熱が 出て、全身に発疹があらわれる	熱がさがってから 3日後
風疹	14～21日	全身に赤い小さな発疹、耳の後ろ やリンパ節のはれ、発熱	熱がさがり、全身の 発疹が全て消えて から
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	14～21日	耳のつけ根からあごにかけての はれ、発熱	はれが出た後5日を 経過し、加えて、全 身の状態がよくなっ てから
水痘 （みずぼうそう）	13～17日	水をもった赤い発疹が全身に出る	発疹が全てかさぶた になってから
インフルエンザ	1～3日	高熱、鼻水、のどの痛み、せき など	症状が出てから5日 を経過し、加えて、 熱がさがってから3 日後
新型コロナウイルス	1～14日	かぜ・インフルエンザ症状と類似	発症後5日経過し、 かつ症状が軽快して から1日後
咽頭結膜熱 （プール熱）	3～9日	高熱、のどの痛み、目の充血、 腹痛、下痢、おう吐	熱がさがり、のどの 痛みが消えてから 2日後
ヘルパンギーナ	2～10日	高熱、のどの奥に小さな水泡	熱がさがって、のど の痛みが消えてから
手足口病	3～7日	手のひらや足の裏、口の中に水泡 （ときに下痢、おう吐、発熱）	主な症状がなくなっ てから
溶連菌感染症	2～5日	のどの痛み、高熱、手足や身体の 発疹、イチゴ状舌	抗菌剤服用してから 24時間後
流行性角結膜炎	5～7日	目やに、激しい充血、軽い熱	主な症状がなくなっ てから

※潜伏期間…病原体に感染してから、からだに症状が現れるまでの期間のこと。感染してもすぐに症状が現れないことがあるので、潜伏期間中は子どもの状態を特に注意してみてください。

上の表はあくまで目安です！必ず医師と相談の上、受診してください。