

個別接種

対象の方：接種当日12～15歳の方のみ

医療機関名	所在地	予約方法 (いずれも休診日は電話予約不可)
ふじせき医院	彦根市高宮町2037	電話予約 (☎23-2233 / 11:30～12:00または18:00～18:30の間のみ受付) または来院時の予約
藤野こどもクリニック	彦根市戸賀町36-6	藤野こどもクリニックのインターネット予約サービス (http://www.fujino-kodomo.jp/reservation.html) または電話予約 (☎47-5311)

集団接種

対象の方：接種当日12歳以上の方 予約開始日：11月4日(木)午前8時30分から

アル・プラザ彦根 4階 (大東町)			くすのきセンター 1階 (八坂町)		
1回目接種日	実施時間帯	2回目予定日	1回目接種日	実施時間帯	2回目予定日
11/13 (土)	午後	12/4 (土)	11/27 (土)	午後	12/18 (土)

接種当日の受付時間など (予約は15分単位) 午後の部 13:45～16:45 (接種時間 14:00～17:00)

- 新型コロナウイルス感染症の影響や悪天候等により予定通り実施できない場合があります。中止の場合は、彦根市ホームページやエフエムひこね(78.2MHz)の毎時報明け(7時～19時)等によりお知らせします。「午後の接種は午前10時30分時点」で彦根市に「暴風警報」が発表された場合は中止になります。「特別警報」の場合は、発表時刻や警報の種類に関わらず、中止になります。台風等の接近等により甚大な被害が予測される場合には、前日までに接種の中止を決定することがあります。中止の際の接種日の振替については、後日改めてお知らせします。
- 受付時間の5分前に受付前にお集まりください。密を避けるためにもご理解をお願いします。
- 連絡なしの遅刻の場合、予約の受付時間が過ぎた時点で予約はキャンセルとなります(1回目キャンセルの場合は2回目も自動的にキャンセルになります)。

予約方法：次のいずれかの方法で接種会場、日時の予約をしてください。

予約専用ウェブサイトで予約

ウェブ予約
<https://jump.mrso.jp/252026/>

LINE
(彦根市公式アカウント)



※接種者情報の入力には予約開始日以前から可能です。

電話 (コールセンター) で予約

☎ **0120-152811**
(土・日・祝日を除く、8:30～17:00)

次の内容を伺います。①券番号 ②生年月日 ③お名前
④日中連絡可能な電話番号 ⑤希望会場 ⑥希望日時

異なる種類の新型コロナワクチン接種について

- 接種日において18歳以上の方でmRNAワクチン(ファイザー社、武田/モデルナ社)の1回目接種後に重篤な副反応を生じたため、2回目接種のみアストラゼネカ社ワクチンの接種を希望する方は、滋賀県アストラゼネカワクチン接種センターで接種を受けることができます。実施期間など、詳しくは滋賀県ホームページで確認ください (<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouthukushi/yakuzi/320756.html>)。
- 10代・20代の男性において、武田/モデルナ社のワクチンよりファイザー社のワクチンの方が接種後に生じる心筋炎等が疑われた報告の頻度が低い傾向が見られます。10代・20代の男性で、1回目を武田/モデルナ社ワクチンで接種した方で2回目の接種はファイザー社ワクチンでの接種を希望される方は彦根市コールセンター(☎0120-152811)へご連絡ください。



新型コロナワクチンの副反応

接種後、すぐに現れる可能性のある症状について

	血管迷走神経反射	アナフィラキシー
症状	ストレスや過度の緊張によって、血圧の低下、脈拍の減少などが生じ、頭がふらふらする、吐き気、発汗などの症状を伴います。	じん麻疹や嘔吐、息苦しさなどの症状が急に起こり、血圧低下や呼びかけに反応しないなどの症状を伴うものをアナフィラキシーショックと呼びます。
対応	血管迷走神経反射自体は、横になって休むことなどで治るので、特に健康上大きな問題になることはありませんが、転倒により怪我をしないよう注意が必要です。接種場所には、横になって休むことができるベッドの準備をしています。また、過去に血管迷走神経反射を起こした人は、ベッドで横になって接種し、そのまま待機していただくこともあります。	起こることは極めてまれですが、接種後にもアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、医薬品を準備しています。

接種後、数日以内に現れる可能性のある症状が出たときの対応について

参考)厚生労働省作成：新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法(ファイザー社、武田/モデルナ社のワクチンについて)チラシより

接種後に体内で免疫ができる過程で、接種部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状が現れることがあります。

【発熱や痛み】

- 市販の解熱鎮痛薬で対応いただくこともできます(アセトアミノフェンが最も用いられますが、その他の解熱鎮痛薬もあります。詳しくは薬剤師や医師にご相談ください)。
- 発熱時には、水分を十分に摂取することをお勧めします。
- 妊娠・授乳中の方や胃潰瘍・腎機能障害・喘息などの持病のある方は、薬剤師や医師にご相談ください。

【かゆみや発赤】

- かゆい場合は冷やしたり、抗ヒスタミン剤やステロイドの外用薬(軟膏等)を塗ると、症状が軽くなります。こうした成分は、市販の虫刺されの薬などにも含まれています。

※症状が重い場合、長引く場合は、医療機関等への受診や相談をご検討ください。

新型コロナワクチンの追加接種(3回目)について

国においては、以下のように検討が進められています。彦根市においても国の方針に基づき準備を進めていく予定です。詳細が分かりましたら、皆様にもお知らせしてまいりますので、お待ちくださいますようお願いいたします。

対象者および回数	2回目接種を終了した者のうち、概ね8か月以上経過した者を対象に、1回追加接種(※対象者の範囲等については、科学的知見や諸外国の対応状況を踏まえ、今後判断することになるとされています)
開始時期	未定(2回目接種終了から概ね8か月以上後)



彦根市健康推進課
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
☎ 24-0816 FAX. 24-5870
彦根市ホームページ
<https://www.city.hikone.lg.jp/>



市ホームページ



Português



English



中文(簡化字)